

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

**Λήθαργος, Βιολογία, Μορφολογία και Χημική αντιμετώπιση
τεσσάρων βιοτύπων του ζιζανίου τάτουλας
(*Datura stramonium* L.)**



Μακρυγιάννης Γεώργιος

Πτυχιακή διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μερική υποχρέωση για τη λήψη του πτυχίου του Γεωπόνου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος



**Λήθαργος, Βιολογία, Μορφολογία και Χημική αντιμετώπιση
τεσσάρων βιοτύπων του ζιζανίου τάτουλα
(*Datura stramonium* L.)**

Μακρυγιάννης Γεώργιος

Εξεταστική Επιτροπή

Λόλας Χ. Πέτρος: Καθηγητής Ζιζανιολογίας, Επιβλέπων

Βαρδαβάκης Εμμανουήλ: Λέκτορας Συστηματικής Βοτανικής, Μέλος

Βυζαντινόπουλος Σ.: Ερευνητής Α' ΕΟ.Ι.ΑΓ.Ε.



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ «ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»**

Αριθ. Εισ.: 9105/1
Ημερ. Εισ.: 12-11-2010
Δωρεά: Συγγραφέας
Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ – ΦΠΑΠ
2010
ΜΑΚ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες θα επιθυμούσα να εκφράσω στον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής διατριβής μου κ. Λόλα Πέτρο, Καθηγητή Ζιζανιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα ζιζάνια, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του, στην διεξαγωγή του πειράματος και συγγραφή της πτυχιακής διατριβής μου. Τον ευχαριστώ ειλικρινά για την συνεργασία που είχαμε καθ'όλη την διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κ. Βαρδαβάκη Εμμανουήλ, Λέκτορα Συστηματικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και Σ. Βυζαντινόπουλο, Ερευνητή Α', για τον χρόνο που αφιέρωσαν για την διόρθωση της εργασίας μου.

Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται στο προσωπικό του Αγροκτήματος και ιδιαίτερα στον κ. Σουίπα Σπύρο, Γεωπόνο Μ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την βοήθειά που μου προσέφεραν κατά την διεξαγωγή του πειράματος στον αγρό. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μεταπτυχιακό φοιτητή Παπαϊωάννου Νικόλαο, για την βοήθεια που μου προσέφερε στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων, καθώς και για την συνδρομή του κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων.

Ευχαριστώ επίσης τους φίλους και συναδέλφους Αποστόλου Κων/νο, Ζαχαρή Μιλτιάδη και Τζαβάρα Σαββούλα, καθώς και την ξαδερφή μου Σπανοπούλου Ασπασία, για την βοήθεια και την συμπαράσταση που μου προσέφεραν για την περάτωση αυτής της εργασίας.

Τέλος, ευχαριστώ ολόψυχα την οικογένεια μου για την αμέριστη συμπαράσταση, υπομονή και κατανόηση σε όλη την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα ζιζάνια, αποτελώντας έναν από τους βιολογικούς ρύπους ενδιαφέρουν άμεσα τη φυτοπροστασία καθιστώντας τον έλεγχό τους απαραίτητο σχεδόν σε κάθε αγροοικοσύστημα.

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί ένα ζιζάνιο με μεγάλη ιστορική διαδρομή και εξάπλωση σε όλες τις θερμές περιοχές του κόσμου. Το επιστημονικό όνομα του ζιζανίου είναι *Datura stramonium*, γνωστό ως τάτουλας και «διαβολόχορτο».

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του ληθάργου, της βιολογίας, της μορφολογίας και της χημικής αντιμετώπισης τεσσάρων βιοτύπων του ζιζανίου τάτουλας. Τα πειράματα διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Η βλαστικότητα των σπόρων του τάτουλα μελετήθηκε σε θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ως προς την θερμοκρασία και τον φωτισμό στις εξής συνθήκες: θερμοκρασία (25° C και 15° C), και σε δύο φωτοπεριόδους (24 ώρες σκοτάδι, 16/8 ώρες σκοτάδι/φως). Αξιολογήθηκαν τρεις επεμβάσεις: τρίψιμο σπόρου με γυαλόχαρτο και τοποθέτηση γιβερίλλικού οξέως 1mg/L στο υπόστρωμα, 0,2 % NKO_3 στο υπόστρωμα, εμφάπτιση του σπόρου σε H_2SO_4 για 20 λεπτά και ξέπλυμα με νερό. Επίσης μελετήθηκε η επίδραση της αποθήκευσης του σπόρου στη βλαστικότητα του. Όλοι οι βιότυποι παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά βλαστικότητας στην μεταχείριση τρίψιμο και γιβερίλλικό οξύ, ενώ οι σπόροι ενός έτους παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά βλάστησης σε σχέση με τους σπόρους ηλικίας ενός (1) έτους.

Τα σημαντικότερα στάδια του βιολογικού κύκλου του ζιζανίου προσδιορίστηκαν με την βοήθεια της κλίμακας B.B.C.H και καταγράφηκαν από την ημέρα σποράς. Η εμφάνιση των κοτυληδόνων πραγματοποιήθηκε 23-25 ημέρες μετά τη σπορά για τους τέσσερις βιότυπους ενώ το πέμπτο πραγματικό φύλλο 46-51 ημέρες. Μετά την εμφάνιση του πέμπτου φύλλου οι βιότυποι άρχισαν να διαφοροποιούν τον βιολογικό τους κύκλο, με τον κόκκινο μεγαλόφυλλο βιότυπο να τον ολοκληρώνει σε 209 ημέρες από την σπορά, τον πράσινο μεγαλόφυλλο σε 158, τον πράσινο κανονικό σε 186, και τον κόκκινο κανονικό σε 174 ημέρες.

Οι μορφολογικές παρατηρήσεις έγιναν στον αγρό και έδειξαν ότι ο πράσινος μεγαλόφυλλος βιότυπος ήταν ο ψηλότερος γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε σε γενετικούς είτε σε περιβαλλοντικούς-κλιματικούς παράγοντες. Έγιναν και άλλες αγρονομικές μετρήσεις που αφορούσαν τον βλαστό, τα άνθη, τα φύλλα, τους καρπούς και τους σπόρους. Διαφοροποιήσεις παρουσίασαν οι κόκκινοι και οι πράσινοι βιότυποι όσον αφορά το χρώμα του βλαστού και των ανθέων τους.

Για την χημική αντιμετώπιση τόσο σε συνθήκες αγρού όσο και σε συνθήκες εργαστηρίου αξιολογήθηκαν 9 ζιζανιοκτόνα: 5 προφυτρωτικά: aclonifen (Challenge 60SC), acetochlor (Harness 84 EC), dimethenamid (Spectrum 72EC), isoxaflutole (Merlin 75 WG) , napropamide (Devrinol 45 SC), 1 ενσωματούμενο: trifluralin (TEΦΕΛ 48 EC) και 3 μεταφυτρωτικά: foramsulfuron (Equip 2,25%), mesotrione (Callisto 10 SC) και το sulcotrione (Mikado 30 SC). Πολύ καλό έλεγχο > 85% σε όλους τους βιότυπους του τάτουλα έδωσαν τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα acetochlor, dimethenamid, isoxaflutole και τα μεταφυτρωτικά mesotrione και sulcotrione.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	7
2. ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ ΤΑΤΟΥΛΑΣ.....	9
3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.....	11
3.1 Λήθαργος.....	12
3.2 Βιολογία.....	12
3.3 Μορφολογία Τάτουλα.....	13
3.4 Αντιμετώπιση.....	14
3.5 Χρήσεις.....	16
3.6 Ζημιές από το ζιζάνιο.....	17
3.6.1 Μείωση απόδοσης καλλιεργειών.....	17
3.6.2 Τοξικές επιδράσεις σε ανθρώπους και ζώα.....	18
3.6.3 Ξενιστές ασθενειών και εχθρών.....	19
3.6.4 Αλληλοπάθεια.....	20
4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ.....	22
4.1 Λήθαργος.....	22
4.2 Βιολογία Τάτουλα.....	22
4.2.1 Πείραμα στο εργαστήριο.....	22
4.2.2 Πείραμα στον αγρό.....	24
4.3 Μορφολογία τάτουλα.....	25
4.4 Χημική αντιμετώπιση του ζιζανίου τάτουλα.....	27
4.4.1 Ζιζανιοκτόνα μελέτης.....	27
4.4.2 Πείραμα στον αγρό.....	30
4.4.3 Πείραμα στο εργαστήριο.....	32
4.5 Στατιστική Ανάλυση.....	32
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.....	33
5.1 Βιολογία.....	33
5.1.1 Βλαστικότητα.....	33
5.1.2 Ρυθμός βλάστησης.....	38
5.1.3 Βιολογικός κύκλος και στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου.....	43
5.2 Μορφολογία Τάτουλα.....	45
5.3 Χημική αντιμετώπιση.....	49
5.3.1 Πείραμα στον αγρό.....	49
5.3.2 Πείραμα στο εργαστήριο.....	50
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	53
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	54
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	59

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζιζάνια, σύμφωνα με τον συμβατικό ορισμό, είναι όλα τα φυτά, αυτοφυή ή καλλιεργούμενα, όσα φυτρώνουν εκεί όπου δεν τα σπέρνουν ή με άλλα λόγια οποιοδήποτε φυτό έξω από τη θέση του, μεγαλώνει δηλαδή εκεί όπου δεν χρειάζεται ή μεγαλώνει στη θέση ενός άλλου χρήσιμου φυτού. Εάν και πότε ένα φυτό χαρακτηρίζεται ζιζάνιο εξαρτάται από το πώς επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του αγροοικοσυστήματος από τον άνθρωπο.

Τα ζιζάνια ίσως είναι σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα στη γεωργία. Σε αντίθεση με τα έντομα και τις ασθένειες, τα ζιζάνια εμφανίζονται στα αγροοικοσυστήματα κάθε χρόνο και εάν δεν ελεγχθούν, τότε όχι μόνο μειώνουν τις αποδόσεις αλλά επηρεάζουν και την ποιότητα των προϊόντων. Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο 10 έως 50 διαφορετικά είδη ζιζανίων εμφανίζονται και μπορεί να προξενήσουν σημαντικές ζημιές στις κύριες καλλιέργειες. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 150 είδη ζιζανίων.

Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στις περισσότερες καλλιέργειες μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτές διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες τις καλλιεργητικές, τις φυσικές-μηχανικές, τις βιολογικές, τις βιοτεχνολογικές και τις χημικές. Ωστόσο, στη σύγχρονη γεωργία δεν αρκεί η αντιμετώπιση των ζιζανίων να είναι αποτελεσματική αλλά θα πρέπει παράλληλα να είναι οικονομική και ανάλογη των επιδιώξεων του ανθρώπου. Στόχος δηλαδή είναι η μεγιστοποίηση των αποδόσεων με το μικρότερο οικονομικό κόστος και ταυτόχρονα τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η χημική μέθοδος στη σημερινή, συμβατική γεωργία αποτελεί τη βάση των προγραμμάτων ελέγχου των ζιζανίων και συμπληρώνεται κατά περίπτωση από τις άλλες μεθόδους. Η εφαρμογή της αφορά τον έλεγχο των ζιζανίων με τη χρησιμοποίηση συνθετικών ουσιών, των ζιζανιοκτόνων. Η σπουδαιότητά τους φαίνεται από το ποσοστό που κατέχουν στο σύνολο των γεωργικών φαρμάκων και αγγίζει το 60-70%.

Πέρα από τις άμεσες, μεγάλης σπουδαιότητας ζημιές που προκαλεί η παρουσία των ζιζανίων στην απόδοση και ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, αυτά επηρεάζουν και έμμεσα τον άνθρωπο. Ο τάτουλας ως γνωστό, εκτός από σημαντικό ζιζάνιο σε διάφορες καλλιέργειες π.χ βαμβάκι, καλαμπόκι έχει και τοξικές ιδιότητες

και η κατανάλωση του μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα. Ο τάτουλας αποτελεί ζιζάνιο γνωστό για τις δηλητηριώδεις ιδιότητές του μετά την κατανάλωσή του από τα ζώα και τον άνθρωπο.

Τα ζιζάνια μπορεί να είναι αγρωστώδη ή πλατύφυλλα. Ανάλογα με την εποχή που φυτρώνουν διακρίνονται σε ανοιζιάτικα και χειμερινά. Τα ανοιζιάτικα βλαστάνουν την άνοιξη, αναπτύσσονται το καλοκαίρι και ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο το φθινόπωρο αφού πρώτα ελευθερώσουν τους σπόρους τους. Τα χειμωνιάτικα αντίθετα, βλαστάνουν το φθινόπωρο ή το χειμώνα αναπτύσσονται τη άνοιξη και ελευθερώνουν τους σπόρους τους αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι. Ανάλογα με τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου, τα ζιζάνια μπορεί να διακριθούν σε μονοετή, διετή και πολυετή, τα οποία είναι και τα πιο δύσκολα στην καταπολέμηση τους. Μια άλλη κατάταξη των ζιζανίων είναι ανάλογα με την καλλιέργεια στην οποία συναντώνται. Έτσι υπάρχουν ζιζάνια καλαμποκιού, σιτηρών, βαμβακιού, αμπελιού κτλ.

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής διατριβής ήταν να γίνει η μελέτη του ληθάργου, της μορφολογίας και της βιολογίας τεσσάρων βιοτύπων του ζιζανίου τάτουλα καθώς και η χημική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων βιοτύπων. Τα πειράματα έγιναν σε συνθήκες αγρού στο Αγρόκτημα της σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε συνθήκες εργαστηρίου στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας.

2. ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ ΤΑΤΟΥΛΑΣ (*Datura stramonium*)

Ο τάτουλας (*Datura stramonium* L.) είναι ετήσιο φυτό. Ανήκει στην οικογένεια Solanaceae η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 2400 είδη (McKenna, 1989) και το γένος *Datura*. Το γένος *Datura* αποτελείται από 15 είδη φυτών, ποώδη έως θάμνους ή και δένδρα, τα οποία συναντώνται σε όλες τις θερμές περιοχές του κόσμου. Όσον αφορά την προέλευση του ζιζανίου τάτουλα υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των βοτανολόγων. Πολλοί Ευρωπαίοι βοτανολόγοι μεταξύ αυτών και ο Λινναίος, αναφέρουν τη Βόρεια Αμερική ως περιοχή προέλευσης του ζιζανίου (Mountain, 1987). Ο Nuttall (1700) θεωρεί τη Νότια Αμερική ή Ασία με αυξημένες πιθανότητες χώρα της Ανατολής ενώ ο de Candolle (1855) δίνει την εκδοχή περιοχής στα σύνορα της Κασπίας θάλασσας. Οι αθίγγανοι υποστηρίζεται ότι είναι υπεύθυνοι για την εξάπλωση του φυτού από χώρα σε χώρα με τη μεταφορά σπόρων (www.botanical.com/botanical/mgmh/t/thornal2.html).

Ο τάτουλας (Εικόνα 1) υπάρχει στις περισσότερες θερμές και υποτροπικές περιοχές του κόσμου και παρατηρείται εκτός από ακαλλιέργητους αγρούς, σε κήπους, σε προαύλια κτιρίων και τα τελευταία χρόνια με αυξητικούς ρυθμούς σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προτιμά έδαφος πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία και απαιτεί αρκετή υγρασία, αλλά μπορεί επίσης να επιβιώσει σε αμμώδη εδάφη με ελάχιστη υγρασία (Weaver and Warwick, 1984).

Στο είδος *Datura stramonium* έχουν ταξινομηθεί τέσσερις ποικιλίες: *Datura stramonium* var *stramonium* L., *Datura stramonium* var *tatula* L. Torr, *Datura stramonium* var *inermis* Jack Timmerman και η *Datura stramonium* var *gordonii* Danert. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες παλαιότερα είχαν καταγραφεί από τους βοτανολόγους ως διαφορετικά είδη (Berkov e.a, 2006).

Στην διεθνή βιβλιογραφία το φυτό συναντάται με διάφορες ονομασίες όπως: Jimsonweed, Locoweed, Stinkweed, Green Dragon, Angel's Trumpet, Mad Apple, Devil's Apple, Thorn Apple και Sacred *Datura* (Clark, 2005). Στην Ελλάδα το φυτό ονομάζεται τάτουλας, διαβολόχορτο, στραμώνιο, και στρύχνος. Κατά την ελληνική ζιζανιολογική εταιρεία το κοινό όνομα αυτού είναι τάτουλας.



Εικόνα 1. Διάφορα μέρη του ζιζανίου *Datura stramonium*(W.Mullera)

3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

3.1 Λήθαργος

Λήθαργος είναι η φυσιολογική κατάσταση στη διάρκεια της οποίας μερικοί σπόροι ή όργανα αγενούς αναπαραγωγής των ζιζανίων και άλλων ειδών, δε φυτρώνουν ή δε βλαστάνουν, αντίστοιχα, ακόμα και αν βρεθούν κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο λήθαργος είναι ο σπουδαιότερος μηχανισμός επιβίωσης και διαίωσης των ζιζανίων, επειδή δεν επιτρέπει σε όλους τους σπόρους ή τα όργανα αγενούς αναπαραγωγής να φυτρώσουν ή να βλαστήσουν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα η αντιμετώπισή τους να μην μπορεί να γίνει με μια μόνο μηχανική κατεργασία του εδάφους.

Ο λήθαργος των σπόρων των ζιζανίων μπορεί να είναι ενδογενής ή προκαλούμενος. Ο πρώτος, που ελέγχεται γενετικά, μπορεί να οφείλεται: α) στα σκληρά και αδιαπέρατα τοιχώματα των σπόρων, β) στην παρουσία ενδογενών ουσιών που αναστέλλουν το φύτρωμα ή στην έλλειψη ουσιών που το προάγουν και γ) σε υπανάπτυκτα έμβρυα. Ο δεύτερος (προκαλούμενος λήθαργος) προκαλείται από μη ευνοϊκές συνθήκες του περιβάλλοντος.

Ο ενδογενής λήθαργος των σπόρων των ζιζανίων αγριοβίκου (*Vicia spp.*) και περικοκλάδας (*Convolvulus arvensis*) οφείλεται στο πρώτο αίτιο, ενώ στο δεύτερο αίτιο οφείλεται ο λήθαργος των ζιζανίων πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*) και βερόνικας (*Veronica hederifolia*). Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι σπόροι των δύο πρώτων ζιζανίων φυτρώνουν μόνον όταν τα τοιχώματά τους καταστραφούν μηχανικά ή αποσυντεθούν μικροβιακά. Αντίθετα, οι σπόροι του πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*) φυτρώνουν αφού πρώτα εκτεθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ οι σπόροι της βερόνικας (*Veronica hederifolia*) σε υψηλές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι διεργασίες που γίνονται μέσα στους σπόρους των δύο τελευταίων ζιζανίων συμβάλλουν στην παραγωγή ουσιών που προάγουν το φύτρωμά τους ή στην εξαφάνιση ουσιών που αναστέλλουν τη φυσιολογική αυτή λειτουργία. Ο ενδογενής λήθαργος του ζιζανίου καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*) οφείλεται στο τρίτο αίτιο και οι σπόροι του δε φυτρώνουν αν δεν περάσει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των εμβρύων τους.

Ο προκαλούμενος ληθάργος εμφανίζεται συχνά στους σπόρους των ζιζανίων πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*), αγριοπιπεριάς (*Polygonum persicaria*) και αγριοπανσέ (*Viola arvensis*) όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν είναι ευνοϊκές. Συγκεκριμένα οι σπόροι των δύο πρώτων ζιζανίων (απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες για να φυτρώσουν) επανέρχονται σε κατάσταση ληθάργου και δε φυτρώνουν όταν εκτεθούν απότομα σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στους σπόρους του τρίτου ζιζανίου (απαιτούν φως για να φυτρώσουν) όταν παραχωθούν στο έδαφος. (www.zizania/genika.gr).

3.2 Βιολογία

Ο τάτουλας είναι ένα εαρινό ζιζάνιο που εμφανίζεται στις καλλιέργειες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Είναι δικοτυλήδονο φυτό και ανήκει στην κατηγορία των πλατύφυλλων ζιζανίων. Προτιμά εδάφη πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία με αρκετή υγρασία, αλλά μπορεί επίσης να επιβιώσει σε αμμώδης εκτάσεις με ελάχιστη υγρασία (Weaver and Warwick, 1984). Όμως οι Καρκάνης κ.α (2006) τονίζουν ότι το υδατικό stress επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ζιζανίου. Επίσης το είδος *Datura* φαίνεται να μην επιβιώνει εύκολα και σε εδάφη τα οποία περιέχουν βαρέα μέταλλα. Από πειραματικά αποτελέσματα, προέκυψε ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις ψευδαργύρου μειώνονται η ανάπτυξη, η φωτοσύνθεση και η συγκέντρωση χλωροφύλλης στα φύλλα του φυτού (Vaillant, e.al, 2005).

Ο τάτουλας είναι κυρίως φυτό αυτογονιμοποιούμενο με ποσοστό σταυρογονιμοποίησης 1,3-18,7% σύμφωνα με στοιχεία του Valverde και των συνεργατών του (2003). Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα των Motten και Antopovics (1992). Ο συνήθης χρωμοσωμικός αριθμός που συναντάται είναι ο $2n=24$ (Mountain, 1987) ενώ έχει παρατηρηθεί από τον Blakeslee (1931) η παρουσία τρισωμικών ($2n+1$) ατόμων. Βοτανικά ανήκει στα δικοτυλήδονα.

Το κοινό διαβολόχορτο είναι εαρινό ζιζάνιο. Αναπτύσσεται την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Όσον αφορά το έδαφος προτιμά τα ουδέτερα και βασικά καλά στραγγιζόμενα εδάφη (Morris, 2004). Οι σπόροι του ζιζανίου διατηρούν τη βλαστικότητα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο αριθμός τους ανά φυτό μπορεί να φθάσει ετησίως τις 23.000 (Levitt & Lovett, 1983). Ο Heiser (1969) διαπίστωσε τη

βλαστικότητα αποθηκευμένων σπόρων 39 ετών σε ποσοστό 90%. Ωστόσο, η βλαστικότητα ποικίλει με βάση πειραματικά αποτελέσματα, γεγονός στο οποίο συμβάλουν σημαντικά παράγοντες όπως η ηλικία των σπόρων καθώς και ο λήθαργος στον οποίο εμπίπτουν μετά την ωρίμανσή τους (Sanchez et al., 1990). Ο Mes (1955) αναφέρει ότι φρέσκοι σπόροι εμφανίζουν μικρή ή καθόλου βλάστηση σε οποιοσδήποτε συνθήκες και με οποιοσδήποτε επεμβάσεις. Αντίστοιχα, οι Rogers και Stearns (1957) σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης σε σπόρους που συλλέχθηκαν 1-2 χρόνια πριν σε σχέση με εκείνους που μόλις έχουν συλλεχθεί.

Για την διακοπή του ληθάργου των σπόρων του ζιζανίου υπάρχουν αρκετές κατάλληλες μεταχειρίσεις όπως εμβάπτιση σε νερό και η εναλλαγή φως και σκωτάδι σε θερμοκρασία 15° C (Andersen, 1968). Ακόμη διαπιστώθηκε πως μετά την εφαρμογή γιβεργιλικού οξέως συγκέντρωσης 10⁻²g σε σπόρους τάτουλα, οι σπόροι παρουσίασαν βλαστικότητα 36% (Hall, et.al, 1991). Επίσης ο Gardner το 1921 επισημαίνει ότι η παρουσία φωτός επιβραδύνει και αναστέλλει την βλαστικότητα των σπόρων του φυτού. Όμως οι Maquaire και Overland παρατήρησαν πολύ χαμηλά ποσοστά βλάστησης σε θερμοκρασία 15° C και την παρουσία σκότους. Υψηλά ποσοστά βλάστησης (88%) παρατηρήθηκαν σε θερμοκρασία 15° C όταν υπήρχε εναλλαγή μεταξύ φως και σκότους (Andersen, 1968). Βλαστικότητα μεγαλύτερη του 75% παρατηρήθηκε σε σπόρους τάτουλα με την εφαρμογή γιβεργιλικού οξέως 1 mg/mL ενώ είχε προηγηθεί τρίψιμο με γυαλόχαρτο (Νικολαΐδου, κ.α, 2006).

3.3 Μορφολογία Τάτουλα

Ο τάτουλας είναι ένα ετήσιο εαρινό, δικοτυλήδονο φυτό. Το ύψος του μπορεί να κυμανθεί από 30-150 cm και έχει αρκετό όγκο. Σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία το μέγεθός του αυξάνει αρκετά. Οι σπόροι του είναι μαύρου ή καφέ χρώματος και έχουν μήκος 3-4 mm. Το σχήμα τους είναι νεφροειδές (www.weedy.com). Ο αριθμός των σπόρων που παράγει ένα φυτό τάτουλα μπορεί να υπερβεί τις 28.000 (Scott e.a., 1999). Οι κοτυληδόνες είναι μακριές, ισχνές, λογχοειδούς σχήματος με μικρό έλασμα (www.plantpro.gr). Τα πρώτα φύλλα του είναι φαρδιά ωοειδή, έμμισχα ενώ τα υπόλοιπα είναι ωοειδή τριγωνικά και στην περιφέρεια είναι οδοντωτά με έντονες νευρώσεις. Το μήκος τους μπορεί να κυμανθεί από 8 έως 15 cm και το πλάτος του από 4 έως 10 cm, ενώ το μήκος του μίσχου είναι συνήθως 3-11 cm. Το

πάνω μέρος των φύλλων έχει σκουροπράσινο χρώμα και είναι λείο στην υφή ενώ το κάτω μέρος των φύλλων έχει πιο ανοιχτό χρώμα (www.weedscience.com).

Ο βλαστός του τάτουλα είναι λείος, όρθιος, χονδρός και μπορεί να έχει πράσινο ή κόκκινο χρώμα ανάλογα με τον βιότυπο. Οι βραχίονες του διακλαδίζονται και στη βάση των διακλαδώσεων εμφανίζουν ένα φύλλο και ένα άνθος. Το άνθος του τάτουλα έχει σχήμα χωνιού είναι σχετικά μεγάλο και μπορεί να είναι είτε άσπρο είτε να έχει στη βάση του ένα ελαφρύ μοβ χρωματισμό ανάλογα με τον βιότυπο. Το μήκος του άνθους είναι 6-10 cm. Ο κάλυκας του φυτού είναι σωληνωτός μεγάλου μήκους με 5 κοφτερές γωνίες (www.weedy.com).

Ο καρπός του τάτουλα είναι κάψα. Έχει μήκος 2,5-4 cm και πλάτος 2-3 cm. Το μέγεθος του καρπού είναι περίπου όσο ένα καρύδι και περιβάλλεται από αιχμηρά αγκάθια. Το χρώμα του είναι πράσινο κατά τον σχηματισμό του ενώ όταν ο καρπός ωριμάσει πλήρως το χρώμα του γίνεται καφέ και η εξωτερική του επιφάνεια σχίζεται. Η ρίζα του είναι χοντρή, πασσαλώδης και αβαθής (www.weedscience.com).

3.4 Αντιμετώπιση

Ο τάτουλας, όπως προαναφέρθηκε είναι ζιζάνιο που παράγει μεγάλο αριθμό σπόρων το χρόνο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ακανόνιστη βλάστησή τους καθιστά απαραίτητη τη λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισής του. Το σπουδαιότερο από τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα είναι η αποφυγή μόλυνσης μιας περιοχής στην οποία δε φύτευται το ζιζάνιο. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αγορά πιστοποιημένων καλλιεργούμενων σπόρων απαλλαγμένων από τους σπόρους του ζιζανίου και με τον κατάλληλο καθαρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Επίσης, η εναλλαγή των καλλιεργειών σε ένα αγροτεμάχιο είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να περιορίσει την εμφάνιση του ζιζανίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει παρατηρηθεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ εναλλαγής καλλιεργειών και χρήσης ζιζανιοκτόνων για τον έλεγχο ζιζανίων, όπως ο τάτουλας. Πειράματα που έγιναν από το 1991 έως το 1994 έδειξαν ότι η εφαρμογή ενός συστήματος αμειψισποράς που περιελάμβανε τις καλλιέργειες: καλαμπόκι, τομάτα και σόγια σε κάποια αγροτεμάχια και σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν την δράση του ενζύμου ALS, μείωσαν σημαντικά τους πληθυσμούς τάτουλα (Manley et.al, 1998).

Βέβαια όπως προαναφέρθηκε ο σημαντικότερος τρόπος αντιμετώπισης των ζιζανίων είναι η χημική αντιμετώπιση. Σε καλλιέργεια τομάτας για αντιμετώπιση ζιζανίων τα οποία ανήκουν στην οικογένεια *Solanaceae*, όπως και ο τάνουλας, προτείνεται η εφαρμογή μεταφυτρωτικά *metribuzin + rimsulfuron* όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των κοτυληδόνων (Tei et.al, 2003). Επίσης, στην Κροατία για την αντιμετώπιση του τάνουλα σε καλλιέργεια τομάτας ως κατάλληλα ζιζανιοκτόνα προτείνονται το *trifluraline* και το *paraquat* (Sanseovic, 1998).

Στην Σερβία μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες είναι αυτή του καλαμποκιού. Τα σημαντικότερα ζιζάνια που εμφανίζονται στις καλλιέργειες του καλαμποκιού είναι ο τάνουλας, η αγριοτομάτα και τα βλήτα. Τα αποτελέσματα από πειράματα που έγιναν στον αγρό έδειξαν, ότι δεν επιβίωσε κανένα φυτό τάνουλα μετά την εφαρμογή *mesotrione+acetochlor* και την εφαρμογή *dimethenamid+nicosulfuron* (Vrbicanin et.al. 2006).

Ο Deng το 2005 αναφέρει ότι το *glyphosate* και το *chlorosulfuron* είναι δύο ζιζανιοκτόνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του τάνουλα. Τα συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα εμποδίζουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του ζιζανίου. Για την καλλιέργεια του καπνού πειράματα που έγιναν στην Δράμα και στο Βόλο το 1998, έδειξαν ότι εφαρμογή του σκευάσματος *clomazone* ελέγχει τον τάνουλα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%. Το *clomazone* εφαρμόστηκε με την μορφή αιωρήματος μικροκάψουλων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η εκλεκτικότητά του στον καπνό και να μην υπάρχουν λευκάνσεις ιστών και σημαντικές μειώσεις χλωρού βάρους σε φυτά καπνού (Τάτση κ.α, 1999).

Όσον αφορά την καλλιέργεια του βαμβακιού η εφαρμογή μεταφυτρωτικά *diuron* ή *diuron* μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ελέγχου του τάνουλα, ενώ προφυτρωτικά πολύ καλά αποτελέσματα μπορεί να δώσει η εφαρμογή *glyphosate* (Hall et.al.1991). Πειράματα που έγιναν στην Ελλάδα, έδειξαν ότι η μεταφυτρωτική εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων *pyridithiobac* και *fluometuron* αντιμετώπισαν άριστα τον τάνουλα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 96%. Τα ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν όταν τα φυτά του βαμβακιού βρισκόταν στο στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το πρώτο φύλλο και τα ζιζάνια στο στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι τα τέσσερα πρώτα φύλλα (Ελευθεροχωρινός, 1999).

Όσον αφορά την καλλιέργεια της αραχίδας η εφαρμογή μεταφυτρωτικά

(POST) bentazone, acifluorfen, imazapic ή μείγμα bentazon+acifluorfen μπορούν να αντιμετωπίσουν τον τάτουλα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% (Hall et.al,1991).

Με τον όρο ανθεκτικότητα εννοούμε την κληρονομική ιδιότητα ενός ζιζανίου να επιβιώνει και να αναπαράγεται μετά από έκθεσή του σε μια δόση ζιζανιοκτόνου η οποία νεκρώνει το φυσικό πληθυσμό του ζιζανίου (Λόλας, 2007). Ανθεκτικότητα του ζιζανίου τάτουλα παρατηρήθηκε και καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ινδία των Η.Π.Α το 1992, σε ζιζανιοκτόνα που παρεμποδίζουν την δράση του φωτοσυστήματος II. Οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν ανθεκτικοί βιότυποι στο ζιζανιοκτόνο atrazine, οι οποίοι εμφανίζουν και σταυρωτή ανθεκτικότητα (JianHua et.al. 1999).

3.5 Χρήσεις

Ο τάτουλας είναι ένα φυτό που οι ιδιότητές του είναι γνωστές στον άνθρωπο από πολύ παλιά. Ινδιάνοι της περιοχής του Τέξας χρησιμοποιούσαν το φυτό στις θρησκευτικές τους εκδηλώσεις, ενώ στην αρχαία Αίγυπτο με την χρήση του τάτουλα η Κλεοπάτρα κατάφερε να σαγηνέψει τον Μάρκο Αντώνιο. Επίσης αναφορές για τον φυτό υπάρχουν σε κείμενα του Ομήρου καθώς και του William Shakespeare.

Οι ιστορικές αναφορές για τον τάτουλα μαρτυρούν ποικίλες χρήσεις. Εκτός από την χρήση του σε διάφορες θρησκευτικές τελετές το φυτό ήταν γνωστό για τις αφροδισιακές του ιδιότητες. Επίσης χρησιμοποιούνταν ως τοπικό καταπραϊντικό για την ανακούφιση των πόνων που προκαλούσαν διάφορες πληγές. Ακόμη το φυτό αυτό χρησιμοποιούνταν και σε τελετές μαγείας της Μεσαιωνικής εποχής. Όμως η πρώτη ιστορική αναφορά για τις τοξικές ιδιότητες του τάτουλα καταγράφηκε το 1676 από την παρατήρηση συμπτωμάτων σε στρατιώτες του Βρετανικού στρατού οι οποίοι είχαν καταναλώσει το συγκεκριμένο φυτό (Clark, 2005).

Ο τάτουλας είναι πλούσιος σε αλκαλοειδή τα οποία εντοπίζονται κυρίως στους σπόρους και στα φύλλα του. Τα κυριότερα αλκαλοειδή είναι η ατροπίνη και η σκοπολαμίνη. Επίσης περιέχει και την ουσία ισοιαμίνη οι οποία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση γαστροεντερικών προβλημάτων (Pretorius and Marx, 2006). Η χρήση των διαφόρων αλκαλοειδών που περιέχονται στο φυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών όπως άσθμα, Parkisson ναυτίες και εμετούς (Clark, 2005).

Όμως η χρήση του φυτού μπορεί να εμπεριέχει και αρκετούς κινδύνους. Η λήψη μεγάλων ποσοτήτων αλκαλοειδών που περιέχονται στον τάτουλα προκαλούν αντιχολινεργική δηλητηρίαση εξαιτίας της δυσλειτουργίας των νευρικών και μυϊκών υποδοχέων (Pretorius and Marx, 2006). Παράλληλα αναφέρονται και ορισμένες άλλες αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία όπως υπέρταση, υπόταση, αναπνευστικά προβλήματα και υπερθερμία. Όλες αυτές οι επιδράσεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο τάτουλας είναι ακατάλληλος για την κατανάλωσή του από τον άνθρωπο (www.wikipedia.org).

Εξαιτίας της αλληλοπάθειας που εμφανίζει το φυτό με ορισμένα φυτικά είδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φυσικό ζιζανιοκτόνο. Σε πειράματα που έγιναν στη Νοτιοανατολική Ασία σε ορυζώνες τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δράση των αλκαλοειδών που περιέχονται στον τάτουλα πρόσφερε ικανοποιητικό έλεγχο στα ζιζάνια που υπήρχαν στον αγρό χωρίς να παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα βλάβης στα φυτά ρυζιού (Hong, e.a, 2004). Ακόμη ο τάτουλας χρησιμοποιείται αρκετά για ερευνητικούς σκοπούς ως φυτό πρότυπο. Οι Weaver και Warnick (1984) αναφέρουν πως το φυτό αυτό χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε γενετικές μελέτες που αφορούν την μορφολογία και την δομή των χρωμοσωμάτων καθώς επίσης και την ανάπτυξη του εμβρύου του φυτού.

3.6 Ζημιές από το ζιζάνιο

3.6.1 Μείωση απόδοσης της καλλιέργειας

Η ικανότητα ανταγωνισμού για φως, νερό και θρεπτικά συστατικά αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των ζιζανίων σε βάρος των καλλιεργειών με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάπτυξη και απόδοση αυτών (Montanya, 2006). Ο Cavego και οι συνεργάτες του το 1999 δημοσίευσαν αποτελέσματα εργασίας τους σε πειραματικό αγρό της Ισπανίας όπου διαπίστωσαν την αρνητική επίδραση του τάτουλα σε καλλιέργεια καλαμποκιού.

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα του Lehoczky και των συνεργατών του (2005) σε πείραμα ανταγωνισμού ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού κατά την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι 2003. Αυτοί διαπίστωσαν ότι ο τάτουλας ήταν ένα από τα ζιζάνια που εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη συχνότητα στην καλλιέργεια ενώ

διαπιστώθηκε και η αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ζιζανιοπληθυσμού και της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό.

Σημαντική κρίνει και η ομάδα του Scott (2000) την επίδραση του τάτουλα στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Επισημαίνοντας την ιδιότητα του τάτουλα να μην μεταβάλει το ύψος του επηρεαζόμενο από την πυκνότητα αλλά και το μικρότερο ανάστημα του βαμβακιού σε σχέση με το ζιζάνιο τονίζει την ύπαρξη ανταγωνισμού για φως. Με την παρέλευση 8 εβδομάδων από το φύτεμα του βαμβακιού παρατηρήθηκε μειωμένο ύψος καθώς η πυκνότητα του τάτουλα αυξήθηκε. Επιπλέον, πυκνότητα φυτών τάτουλα 1-32 παρουσίασε μείωση παραγωγής καψών του βαμβακιού, από 92 σε 60. Ο ανταγωνισμός δεν άφησε ανεπηρέαστο και το μήκος της ίνας σε συνθήκες αυξημένης βιομάζας και πυκνότητας του ζιζανιοπληθυσμού. Τέλος, βρέθηκε μείωση της παραγωγής κατά 10 και 25% για 0,5 και 1,5 φυτά τάτουλα, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και σε αυτές εμφανίζεται σπουδαίος ο ρόλος του ζιζανίου από τους Montanya και Ponce (2006). Αρκεί να αναφερθεί η επίδρασή του στην παραγωγή καρπών, την ανάπτυξη και απορρόφηση αζώτου από φυτά τομάτας και πιπεριάς, με εκείνα της πιπεριάς να φέρονται περισσότερο ευάλωτα.

3.6.2 Τοξικές επιδράσεις σε ανθρώπους και ζώα

Το ζιζάνιο τάτουλας είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις τοξικές του ιδιότητες, με τα τοξικά συστατικά να συγκεντρώνονται σε όλα τα μέρη του φυτού με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις στα φύλλα και τους σπόρους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην παρουσία αλκαλοειδών και κυρίως της ατροπίνης και σκοπολαμίνης με τη συγκέντρωση αυτών ανά φυτό να είναι 1,69-2,71mg/mL και 0,36-0,69mg/mL αντίστοιχα (Talaty et al., 2005). Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναφέρθηκαν περίπου 300 συμβάντα ανά έτος για τα έτη 1991-1993 ενώ αυτά αυξήθηκαν σε 500 για τα έτη 1994-1995 (Forrester, 2006). Δηλητηριάσεις, ακόμη και θάνατοι έχουν αναφερθεί και σε ζώα όπως κασίκες, χοίρους, κότες μετά την κατανάλωση μολυσμένων δημητριακών με σπόρους του ζιζανίου (www.henriettesherbal.com/eclectic/usdisp/datura_stra.html) και άλογα μετά την κατανάλωση του ζιζανίου, ωστόσο σε μικρότερη έκταση σε σχέση με τον άνθρωπο

(<http://en.wikipedia.org/wiki/Daturastramonim>). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην τάση των ζώων να καταναλώνουν δηλητηριώδη ζιζάνια μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη τροφή αφού τα φυτά αυτά έχουν έντονη δυσάρεστη οσμή και ανεπιθύμητη γεύση (www.henriettesherbal.com/eclectic/usdisp/datura_stra.html).

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι σπόροι του τάτουλα αναμιγνύονται με ζωοτροφές και εξαιτίας των αλκαλοειδών ατροπίνης και σκοπολαμίνης που περιέχουν, δημιουργούν τον κίνδυνο δηλητηρίασης των ζώων (Mendel, 2004). Έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά δηλητηρίασης ζώων από τάτουλα. Για παράδειγμα άλογα στην Ισπανία παρουσίασαν έντονους κοιλιακούς πόνους. Τα άλογα είχαν τραφεί με σανό μηδικής. Οι αναλύσεις του σανού έδειξαν ότι σε ορισμένες μπάλες σανού, υπήρχε μεγάλη ποσότητα από φυτά τάτουλα (Soler-Rodriguez e.a, 2006). Επίσης έχει αναφερθεί το γεγονός ότι όταν οι οφθαλμοί των σκυλιών έρθουν σε απλή επαφή με τον τάτουλα παρουσιάζουν συμπτώματα ανισοκορίας (Hansen and Clerk, 2002).

Στην Ελλάδα κάποια άτομα τα οποία είχαν καταναλώσει ως τροφή βλήτα από την περιοχή των Μεγάρων παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τα οποία στάλθηκαν στον ΕΦΕΤ, τα δείγματα με βλήτα, από την περιοχή των Μεγάρων, που κατανάλωσαν τα άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, είχαν ποσοστά των τοξικών ζιζανίων τάτουλα (*Datura stramonium*) και αγριοντομάτα (*Solanum nigrum*) (www.agrotypos.gr).

Ο τάτουλας είναι φυτό που συνήθως ανθίζει το βράδυ. Όμως έχουν καταγραφεί και αρκετές περιπτώσεις που ανθίζει την ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση αν συλλέξουν μέλισσες γύρη από τον τάτουλα, η μεταφερόμενη γύρη εξαιτίας των αλκαλοειδών που περιέχει, προκαλεί συμπτώματα τοξικότητας στον γόνο (Θρασυβούλου, 2001).

3.6.3 Ξενιστές ασθενειών και εχθρών

Ο τάτουλας έχει και αρκετά έντομα ξενιστές. Τέτοια έντομα είναι τα φυλλοφάγα *Epitrix parvula* και *Sphenarium purpurascens* (Nunez-Farfán and Dirzo, 1994). Όμως υπάρχουν και έντομα που ξενίζουν τον τάτουλα και μεταδίδουν ασθένειες σε άλλες καλλιέργειες από μολυσμένα φυτά τάτουλα. Για παράδειγμα, τα

ενήλικα έντομα του *Thrips tabaci* μεταδίδουν τον ιό του μαρασμού μετά κηλιδώσεως της τομάτας (TSWV) τόσο σε φυτά τάρτουλα όσο και σε καλλιέργειες καπνού. Τα έντομα με την μεγαλύτερη ικανότητα μετάδοσης του ιού, σύμφωνα με το πείραμα, ήταν τα ενήλικα θηλυκά (Chatzivasiliou et al., 2007).

Στην περίπτωση του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (TSWV) παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός ανάπτυξης συμπτωμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες (Llamas et al., 1998).

Το ζιζάνιο εμφανίζεται ευαίσθητο σε περισσότερους από 60 ιούς (Mountain, 1987). Μεταξύ των σημαντικότερων ιών που το προσβάλλουν είναι ο ιός του μωσαϊκού του αγγουριού (CMV), του κριθαριού (AMV) και ο ιός Y της πατάτας (PVY) (Ormeno et al. 2006) <http://image.fs.uidaho.edu/vide/famly124.htm#Datura%20stramonium>).

3.6.4 Αλληλοπάθεια

Ο όρος αλληλοπάθεια προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ‘άλληλο’ και σημαίνει ο ένας τον άλλο και τη λέξη ‘πάθος’ που σημαίνει πόνος (Oudhia, 2000) και αναφέρεται στην από μέρους ενός φυτού προσθήκη στο περιβάλλον του ενός ή περισσότερων χημικών ουσιών που παρεμποδίζουν ή θα παρεμποδίσουν την κανονική αύξηση – ανάπτυξη ενός άλλου φυτού στο ίδιο περιβάλλον (Λόλας, 2007). Ο τάρτουλας είναι ένα ζιζάνιο που χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της αλληλοπάθειας (Oudhia, 2000). Σπόροι πεσμένοι στο έδαφος απελευθερώνουν ουσίες που δρουν παρεμποδιστικά στην ανάπτυξη άλλων φυτών στην ίδια περιοχή. Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι σε στήλη χώματος στην οποία φύονταν το φυτό βρέθηκε ανθεκτικό στη μικροβιακή προσβολή για διάστημα 5 εβδομάδων (Levitt & Lovett, 1983). Όσον αφορά την επίδραση σε επίπεδο φυτών, στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί αποτυχιές καλλιέργειας βάμβακος, σόργου και σόγιας σε αγρούς μολυσμένους με τάρτουλα (Narwal, 1994).

Τοξική επίδραση του ζιζανίου, έχει επίσης παρατηρηθεί στη βλάστηση σπόρων ηλιάνθου σε όλους τους τύπους εδαφών, ωστόσο ο τύπος του εδάφους διαπιστώθηκε ότι καθορίζει το μέγεθος του προβλήματος. Πειραματικά αποτελέσματα έχουν δείξει την παραμονή φυτοτοξικότητας σε έδαφος που περιέχει

καολινίτη και ιλίτη για 20 εβδομάδες και για 8 εβδομάδες σε αργιλούχο έδαφος σε ελεγχόμενες συνθήκες (Levitt & Lovett, 1983).

4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1 Γενικά

Τα πειράματα της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βελεστίνο Μαγνησίας κατά την περίοδο άνοιξη-φθινόπωρο 2007 και στο εργαστήριο Ζιζανιολογίας κατά την περίοδο χειμώνας-φθινόπωρο 2007.

Οι βιότυποι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Πράσινος Κανονικός (ΠΚ), Κόκκινος Κανονικός (ΚΚ), Πράσινος Μεγαλόφυλλος (ΠΜ) και Κόκκινος Μεγαλόφυλλος (ΚΜ). Οι σπόροι που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα είχαν συλλεχθεί από την περιοχή του Βελεστίνου τα έτη 2005 και 2006 ενώ ένας βιότυπος είχε συλλεχθεί το 2006 από την περιοχή της Λάρισας. Η δοκιμή έγινε δύο φορές.

4.2 Βιολογία Τάτουλα

Η βιολογία του τάτουλα αφορούσε τις συνθήκες βλάστησης του σπόρου σε θαλάμους βλάστησης στο εργαστήριο και τον χρόνο εμφάνισης των σημαντικότερων σταδίων ανάπτυξης του ζιζανίου στον αγρό.

4.2.1 Πείραμα στο εργαστήριο.

Σκοπός του πειράματος ήταν να ερευνηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διακοπής του λήθαργου και η βλάστηση των σπόρων τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα. Εξετάστηκε επιπλέον εάν επιδρά στην διακοπή του λήθαργου ο χρόνος συγκομιδής και αποθήκευσης του σπόρου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκαν σπόροι συγκομισθέντες 2005 και το 2006 αντίστοιχα.

Η βλαστικότητα των σπόρων του τάτουλα μελετήθηκε σε θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ως προς την θερμοκρασία και τον φωτισμό στις εξής συνθήκες:



- Θερμοκρασία 15° C και 25° C
- Φωτοπερίοδο: 24 ωρών σκοτάδι και 8 ωρών φως/16 ωρών σκοτάδι

Σε αυτές τις συνθήκες, τρεις μεταχειρίσεις για την διακοπή του ληθάργου εφαρμόστηκαν ως εξής:

- Τρίψιμο σπόρου με γυαλόχαρτο (ως που να μειωθεί το βάρος των μεταχειριζόμενων σπόρων περίπου 2,5% του αρχικού βάρους) και τοποθέτηση γιβερίλλικού οξέως 1mg/L στο υπόστρωμα,
- 0,2 % NKO_3 στο υπόστρωμα,
- Εμβάπτιση του σπόρου σε H_2SO_4 για 20 λεπτά και ξέπλυμα με νερό και τοποθέτηση στο υπόστρωμα με νερό.

Για την αποφυγή μόλυνσης του σπόρου, πριν γίνουν οι δύο πρώτες επεμβάσεις οι σπόροι τοποθετήθηκαν για δέκα λεπτά σε διάλυμα χλωρίνης και στην συνέχεια ξεπλύθηκαν με άφθονο απεσταγμένο νερό. Για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά τριβλία Petri. Σε κάθε τριβλίο τοποθετήθηκε διηθητικό χαρτί και πάνω σε αυτό 10 σπόροι τάτουλα οι οποίοι είχαν δεχθεί συγκεκριμένη μεταχείριση. Στην συνέχεια οι σπόροι διαβρέχθησαν με 6 mL απεσταγμένου νερού ή GA_3 ή NKO_3 ανάλογα με την επέμβαση. Τα τριβλία αφού δέχτηκαν συγκεκριμένη σήμανση τοποθετήθηκαν στους θαλάμους βλάστησης.

Κάθε 2-3 ημέρες γινόταν καταγραφή των σπόρων που είχαν βλαστήσει σε κάθε τριβλίο, και προσθήκη απεσταγμένου νερού αν κρίνονταν απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει διατήρηση μιας συγκεκριμένης υγρασίας στα τριβλία. Η διατήρηση των τριβλίων στους θαλάμους βλάστησης διήρκεσε 20-25 ημέρες. Κάθε επέμβαση είχε τρεις επαναλήψεις ενώ το πείραμα πραγματοποιήθηκε δυο φορές για κάθε θερμοκρασία.

4.2.2 Πείραμα στον αγρό

Για να μελετηθεί η βιολογίας του τάτουλα, εγκαταστάθηκε πείραμα στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στις 2 Μαΐου 2007. Δημιουργήθηκαν 4 πειραματικά τεμάχια, ένα για κάθε βιότυπο, τα οποία είχαν διαστάσεις 2x1,5 m. Σε κάθε πειραματικό τεμάχιο σπάρθηκαν 2 γραμμές τάτουλα μήκους 2m με δέκα θέσεις σποράς οι οποίες απείχαν μεταξύ τους 50cm. Στην συνέχεια ακολούθησε πότισμα με τεχνητή βροχή για να διευκολυνθεί το φύτευμα. Μετά το φύτευμα εγκαταστάθηκε σύστημα στάγδην άρδευση για την καλύτερη άρδευση των φυτών. Η άρδευση γινόταν όποτε κρίνονταν απαραίτητο ενώ παράλληλα γινόταν σε τακτά διαστήματα βοτάνισμα των υπολοίπων ζιζανίων με το χέρι για να μην υπάρχει ανταγωνισμός εντός των πειραματικών τεμαχίων.

Ο βιολογικός κύκλος των τεσσάρων βιοτύπων του ζιζανίου μελετήθηκε με την καταγραφή ορισμένων σταδίων ανάπτυξης του τάτουλα και του χρόνου εμφάνισης των σταδίων αυτών σε ημέρες από την σπορά. Για την καταγραφή αυτή χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα B.B.C.H η οποία είναι ένα σύστημα ομοιόμορφης κωδικοποίησης των φαινοτυπικά ίδιων σταδίων ανάπτυξης των φυτών, ισχύει τόσο για τα μονοκοτυλήδονα όσο και για τα δικοτυλήδονα φυτά, και βασίζεται στον γνωστό κώδικα των δημητριακών που ανέπτυξε ο Zadoks και οι συνεργάτες του το 1974. Η κλίμακα B.B.C.H αναπτύχθηκε από κοινού από τα Γερμανικά ερευνητικά κέντρα BBA, BSA και IVA.

Η κλίμακα αποτελείται από ένα δεκαδικό σύστημα με δέκα βασικά στάδια ανάπτυξης και περισσότερα από δέκα δευτερεύοντα, αρχίζοντας από το φύτευμα του σπόρου και φθάνοντας ως το γηρασμό του σπόρου. Το σύστημα εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε στα ζιζάνια ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε έρευνα της ανάπτυξης των φυτών αυτών (Hess et al.,1997). Τα φαινολογικά στάδια που καταγράφηκαν στο πείραμα στον αγρό φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Τα στάδια ανάπτυξης που καταγράφηκαν κατά την μελέτη της βιολογίας του τάτουλα σύμφωνα με την κλίμακα B.B.C.H.

Κωδικός σταδίου	Περιγραφή
0	Σπορά
10	Εμφάνιση κοτυληδόνων
11	1ο φύλλο
13	2ο φύλλο
15	5ο φύλλο
31	1ο Μ.Δ.
33	2ο Μ.Δ.
35	5ο Μ.Δ.
51	Έναρξη έκπτυξης άνθους
59	Πλήρης έκπτυξη άνθους
71	Εμφάνιση καρπών
81	Έναρξη ωρίμανσης καρπών
89	Πλήρης ωρίμανση καρπών
97	Θάνατος φυτού

4.3 Μορφολογία τάτουλα

Στα φυτά όπου μελετήθηκε η βιολογία του τάτουλα πάρθηκαν επιπλέον και κάποιες αγρονομικές μετρήσεις και παρατηρήσεις ώστε να καταγραφεί και η μορφολογία του τάτουλα. Οι μετρήσεις που πάρθηκαν κατά την διεξαγωγή του πειράματος φαίνονται στον Πίνακα 2:



Εικόνα 2. Άνθος κόκκινου βιότυπου τάτουλα

Πίνακας 2.Μορφολογικές παρατηρήσεις που καταγράφηκαν κατά την μελέτη του φυτού τάτουλας

Μέρος του φυτού	Μέτρηση
Κοτυληδόνες	Σχήμα κοτυληδόνων
Φύλλα	Διαστάσεις 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου
Άνθος	Χρώμα άνθους Διαστάσεις άνθους
Βλαστός	Χρώμα βλαστού Μήκος 1 ^{ου} , 3 ^{ου} , 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος Τελικό ύψος φυτού
Καρπός	Αριθμός σπόρων / κάψα Βάρος σπόρου

4.4 Χημική αντιμετώπιση του ζιζανίου τάτουλα

4.4.1 Ζιζανιοκτόνα μελέτης

Για της χημική αντιμετώπιση του τάτουλα χρησιμοποιήθηκαν εννέα ζιζανιοκτόνα από τα οποία τα πέντε εφαρμόστηκαν προφυτρωτικά (PRE), ένα ζιζανιοκτόνο ήταν προσπαρτικό ενσωματούμενο (PPI) και τρία ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν μεταφυτρωτικά (POST). Η επιλογή των ζιζανιοκτόνων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφία αλλά και την κυκλοφορία των συγκεκριμένων σκευασμάτων στην Ελλάδα. Η μελέτη της χημικής αντιμετώπισης του τάτουλα έγινε τόσο σε συνθήκες αγρού αλλά και σε συνθήκες Εργαστηρίου σε φυτοδοχεία.

Τα ζιζανιοκτόνα που εφαρμόστηκαν προφυτρωτικά ήταν τα aclonifen (Challenge 60SC), acetochlor (Harness 84 EC), dimethenamid (Spectrum 72EC), isoxaflutole (Merlin 75 WG), napropamide (Devrinol 45 SC). Προσπαρτικά με ενσωμάτωση εφαρμόστηκε το trifluralin (ΤΕΦΕΛ 48 EC). Μεταφυτρωτικά εφαρμόστηκαν τα foramsulfuron (Equip 2,25%), mesotrione (Callisto 10 SC) και το sulcotrione (Mikado 30 SC)

acлонifen (Challenge 60SC): Το acлонifen μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για καλλιέργειες καλαμποκιού, σιταριού, πατάτας, καπνού και πολλών λαχανικών. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πλατύφυλλων αλλά και κάποιων αγρωστωδών ζιζανίων. Ανήκει στην οικογένεια των διφαινυλαιθέρων. Παρεμβαίνει στην σύνθεση καροτενοειδών χωρίς να είναι ακόμη πλήρως εξακριβωμένος ο μηχανισμός δράσης του. Μετακινείται τόσο συμπλαστικά όσο και αποπλαστικά.

Η ανάπτυξη των ευαίσθητων μερών του φυτού σταματά μερικές ώρες μετά την εφαρμογή του φαρμάκου αλλά μακροσκοπικά συμπτώματα στο φυτό παρατηρούνται 15 μέρες ή περισσότερο μετά την εφαρμογή του. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της δράσης του acлонifen είναι χλωρωτικές και νεκρωτικές κηλίδες στην φυλλική επιφάνεια των φυτών (Herbicide Handbook, 2002).

acetochlor (Harness 84 EC): Το συγκεκριμένο σκεύασμα εφαρμόζεται προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά για την αντιμετώπιση ετήσιων ζιζανίων στις καλλιέργειες αραβοσίτου, σόγιας αραχίδιας βαμβακιού πατάτας και ηλιάνθου. Μπορεί να γίνει η εφαρμογή του σε συνδυασμό με atrazine ή

terbuthylazine στην καλλιέργεια του αραβοσίτου για να αντιμετωπιστεί ένα ευρύτερο φάσμα ζιζανίων (Ελευθεροχωρινός, 2002).

dimethenamid (Spectrum 72EC): Ανήκει στα χλωρακεταμίδια. Χρησιμοποιείται προφυτρωτικά στην τομάτα, στην πιπεριά, στην αραχίδα, στον καπνό, σε καλλωπιστικά φυτά καθώς και σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Ελέγχει τα ζιζάνια μουχρίτσα, αιματόχορτο, βλήτο, σετάριας και βέλιουρα. Μηχανισμός δράσης του πιστεύεται ότι είναι η παρεμπόδιση σύνθεσης μιας μακράς αλυσίδας λιπαρών οξέων. Είναι ζιζανιοκτόνο μη πτητικό, εκπλύνεται σε ελαφρά εδάφη και ελέγχει τα ζιζάνια σε μια καλλιέργεια για 6-8 μήνες (Λόλας, 2007).

isoxaflutole (Merlin 75 WG): Το isoxaflutole είναι ένα ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των ισοξαζολιδινών. Πειράματα σε αγρούς κατά την περίοδο 1993-1997 έδειξαν ότι το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο μπορεί να ελέγξει πάρα πολύ καλά τόσο αγρωστώδη όσο και πλατύφυλλα ζιζάνια στην καλλιέργεια του καλαμποκιού. Αν εφαρμοστεί προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά σε εξαιρετικά χαμηλές δόσεις (7,5-10 g δ.ο/στρ) ελέγχει σημαντικά ζιζάνια όπως η αγριοβαμβακιά, η αγριοτομάτα, ο τάτουλας, το αιματόχορτο και η μουχρίτσα.

Η δράση του isoxaflutole βασίζεται στην παρεμπόδιση του σχηματισμού ενός ενζύμου, του EPPD, που είναι υπεύθυνο για την σύνθεση των καροτενοειδών. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η καταστροφή της χλωροφύλλης και συνεπώς η νέκρωση των ζιζανίων. Στον αγρό το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο παρέχει σημαντική υπολειμματική δράση, διασπάται όμως γρήγορα κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου χωρίς να δημιουργεί προβλήματα για τις επόμενες καλλιέργειες (Κατσιβάς, 1999).

napropamide (Devinol 45 SC): Ανήκει στην οικογένεια των αμιδίων, εφαρμόζεται προφυτρωτικά σε καλλιέργειες αγκινάρας, σπαραγγιών και κάποιων αρωματικών φυτών. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μικρότερη δοσολογία προφυτευτικά σε ορισμένες κηπευτικές καλλιέργειες όπως η καλλιέργεια τομάτας και μελιτζάνας. Ακόμη χρησιμοποιείται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά για τον έλεγχο ζιζανίων σε δενδρώδεις καλλιέργειες όπως εσπεριδοειδή και υποτροπικά φυτά. Το napropamide ελέγχει πολλά ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα αγρωστώδη.

Κινείται μέσα στο πλασμαλήμμα με παθητική διάχυση. Ο μηχανισμός δράσης του δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός. Πιστεύεται ότι εμποδίζουν την αύξηση μέσω της διαδικασίας της μίτωσης ακραίων μεριστωμάτων. Αποικοδομείται στο

έδαφος από τους μικροοργανισμούς με αργό ρυθμό για αυτό και η παρουσία του στο έδαφος είναι περίπου 9-12 μήνες (Herbicide Handbook, 2002).

trifluralin (TEΦΕΛ 48 EC) Είναι προσπαρτικό ενσωματούμενο, εκλεκτικό σε αραχίδα, βαμβάκι, ηλίανθο, φασόλι, μπάμια και προφυτευτικά σε τομάτα, πιπεριά, λάχανο και κουνουπίδι. Μαζί με το pendimethalin ίσως χρησιμοποιούνται στις περισσότερες καλλιέργειες. Εκτός από τα συνηθισμένα πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια ελέγχει και το τριβόλι. Η ενσωμάτωσή του δεν πρέπει να καθυστερεί περισσότερο από 24 ώρες. Συνθήκες stress στα φυτά μπορεί να βοηθήσουν την φυτοτοξικότητά του. Είναι αποτελεσματικό σε ισχυρά οργανικά εδάφη και μπορεί να συνδυαστεί με πολλά ζιζανιοκτόνα (Λόλας, 2007).

foramsulfuron (Equip 2,25%) Αποτελεί ένα νέο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού. Η δραστική ουσία formasoulfouron ανήκει στην οικογένεια των σουλφονουλουριών και ελέγχει αποτελεσματικά διάφορα αγρωστώδη ζιζάνια όπως βέλιουρας, μουχρίτσα και σετάρια. Επίσης ελέγχει και ένα μεγάλο αριθμό πλατύφυλλων ζιζανίων όπως τα βλήτα, η αγριοτομάτα, ο τάτουλας, η λουβουδιά και η αγριοβαμβακιά καθώς και πολλά άλλα. Το formasoulfouron σε δόσεις 4-6 g δ.ο/στρ εξασφαλίζει πολύ καλή αποτελεσματικότητα εναντίον των ζιζανίων καθώς και ευελιξία στην εφαρμογή από τα δύο μέχρι και τα έξι φύλλα της καλλιέργειας.

Όπως κάθε σουλφονουλουρία έτσι και το formasoulfouron αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξειογαλακτική συνθετάση (ALS) αλλά δεν είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Η εκλεκτικότητα του EQUIP εξασφαλίζεται με την ενσωμάτωση μιας αντιφυτοτοξικής ουσίας η οποία ελαχιστοποιεί την τοξική δράση του ζιζανιοκτόνου. Έτσι το συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στα περισσότερα υβρίδια καλαμποκιού που καλλιεργούνται τόσο για την παραγωγή καρπού όσο και για την παραγωγή ενσιρώματος (Παρέντης 2004).

mesotrione (Callisto 10 SC) Κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 2002. Ανακαλύφθηκε από την μελέτη δράσης της ουσίας leptospermonone του φυτού *Callistenon citrinus*. Ανήκει στην οικογένεια των τρικετονών και ο μηχανισμός δράσης του βασίζεται στην παρεμπόδιση της δράσης του ενζύμου υδροξυφαινυλπυρουβική διοξυγενάση (4-HPPD) κατά την σύνθεση των καροτενοειδών.

Είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο καλαμποκιού για προφυτρωτική ή μεταφυτρωτική εφαρμογή. Απορροφάται γρήγορα τόσο από τις ρίζες όσο και από το

φύλλωμα και μετακινείται μέσα στο φυτό σε όλα τα μέρη. Συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα καλαμποκιού, όπως nicosulfuron, rimsulfuron, atrazine κ.α, για την διερεύνηση του φάσματος δράσης του.

Ελέγχει αποτελεσματικά πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Στο καλαμπόκι μεταβολίζεται γρήγορα με τα ένζυμα της ομάδας CytP450. Στο έδαφος διασπάται μικροβιακά και έχει διάρκεια ημιζωής από 5 έως 15 ημέρες. Δεν εκπλύνεται και δεν είναι πτητικό (Λόλας, 2007)

sulcotrione (Mikado 30 SC) Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο στο καλαμπόκι. Ανήκει στην οικογένεια των τρικετονών. Η εκλεκτική του δράση οφείλεται στην ικανότητά του μεταβολισμού από τα φυτά του καλαμποκιού. Ελέγχει πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Απορροφάται από τα φύλλα και τη ρίζα και εκδηλώνει την δράση του συμπληρωματικά.

Ως μηχανισμός δράσης του θεωρείται η παρεμπόδιση της δράσης του ενζύμου υδροξυφαινυλπυρουβική διοξυγενάση (4-HPPD). Αποτέλεσμα του μηχανισμού δράσης του sulcotrione είναι η μείωση της βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης που εκφράζεται με χλώρωση στη νέα βλάστηση των ευαίσθητων ζιζανίων. Επίσης επιδρά στην βιοσύνθεση καροτενοειδών. Η υπολειμματική του διάρκεια στο έδαφος είναι μικρή και για αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα κατά την εγκατάσταση των καλλιεργούμενων φυτών κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (Ελευθεροχωρινός, 2002).

4.4.2 Πείραμα στον αγρό

Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή του πειράματος ήταν οι πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες (Randomized Complete Blocks RCB) με τρεις επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Η τυχαιοποίηση των επεμβάσεων στα πειραματικά τεμάχια έγινε με την βοήθεια στατιστικών πινάκων (Φασούλας, 1992).

Η εγκατάσταση του πειράματος έγινε στις 2 Μαΐου 2007. Κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε διαστάσεις 2x2m, περιλάμβανε οκτώ γραμμές σποράς, δύο για κάθε βιότυπο του ζιζανίου, με δέκα θέσεις σποράς η κάθε γραμμή και ένα σπόρο ανά θέση. Μεταξύ κάθε πειραματικού τεμαχίου υπήρχαν κενά 0,50 cm. Οι θέσεις σποράς

επισημάνθηκαν με ξύλινα καλαμάκια προκειμένου να είναι εντοπισμένη η θέση του κάθε ζιζανίου.

Τα ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε εφαρμογή των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων με ψεκαστήρα χειρός στις 2 Μαΐου. Για το προσπαρτικό ζιζανιοκτόνο πρώτα έγινε εφαρμογή του στο έδαφος με ψεκαστήρα χειρός, στην συνέχεια τα πειραματικά τεμάχια οργώθηκαν με φρέζα για ενσωμάτωση του ζιζανιοκτόνου και κατόπιν έγινε σπορά του ζιζανίου. Στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο του τέταρτου και πέμπτου πραγματικού φύλλου. Η δόση για κάθε σκεύασμα υπολογίστηκε για επιφάνεια 4m². Τα πειραματικά τεμάχια αρδεύονταν με τεχνητή βροχή σε τακτά χρονικά διαστήματα και απομακρυνόταν με το χέρι διαφορετικά από τον τάτουλα ζιζάνια.

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των ζιζανιοκτόνων κατά του τάτουλα εκτιμήθηκε μακροσκοπικά ως επί τοις εκατό έλεγχος σε κάθε πειραματικό τεμάχιο που είχε δεχτεί ζιζανιοκτόνο σε σχέση με τον μάρτυρα. Οι δόσεις που εφαρμόστηκαν για κάθε πειραματικό τεμάχιο για κάθε ζιζανιοκτόνο φαίνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Ζιζανιοκτόνα, χρόνος εφαρμογής και συνιστώμενες δόσεις

Μεταχειρίσεις	Χρόνος εφαρμογής	Δόση δραστική ουσία/στρέμμα (g/στρέμμα)	Δόση σκευάσματος (mL,g/στρέμμα)
1. Callisto (mesotrione) 10SC	POST	7.5	75
2. Challenge (aclonifen) 60SC	PRE	240	400
3. Devrinol (napropamide) 45SC	PRE	225	500
4. Equip (foramsulfuron) 2,25%	POST	5.6	250
5. Harness (acetochlor) 84EC	PRE	210	250
6. Mikado (sulcotrione) 30 SC	POST	45	150
7. Merlin (isoxaflutole) 75WG	PRE	9	12
8. Spectrum (dimethenamid) 72EC	PRE	100.8	140
9. ΤΕΦΕΛ (trifluralin) 48EC	PPI	144	300

4.4.3 Πείραμα στο εργαστήριο

Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι πλήρεις τυχαιοποιημένες ομάδες (Randomized Complete Blocks RCB) με τέσσερις επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Το έδαφος που χρησιμοποιήθηκε συλλέχθηκε από το Αγρόκτημα στο Βελεστίνο από οργωμένο χωράφι που είχε προηγούμενη καλλιέργεια σιτηρά. Το χώμα αφού υπέστη έναν ακόμη θρυμματισμό τοποθετήθηκε σε φυτοδοχεία στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας σε περιβάλλον θερμοκηπίου. Το πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Η πρώτη επανάληψη έγινε από 5 Μαρτίου έως 15 Μαΐου, ενώ η δεύτερη επανάληψη από 2 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.

Τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν με ψεκαστήρα χειρός κατά την ημερομηνία της σποράς. Το προσπαρτικό ζιζανιοκτόνο εφαρμόστηκε υπό την μορφή διαλύματος στο έδαφος, το έδαφος αναμοχλεύτηκε σε πλαστικές σακούλες και στην συνέχεια ακολούθησε σπορά του ζιζανίου. Τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα εφαρμόστηκαν αργότερα όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο του τέταρτου και πέμπτου μόνιμου φύλλου. Οι δόσεις που εφαρμόστηκαν για κάθε ζιζανιοκτόνο στα πειράματα εργαστηρίου υπολογίστηκαν για επιφάνεια $0,0075\text{m}^2$ που είναι το εμβαδόν του κάθε φυτοδοχείου.

4.5 Στατιστική Ανάλυση

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την μελέτη της βλαστικότητας και της χημικής αντιμετώπισης του ζιζανίου με τη χρήση ζιζανιοκτόνων υποβλήθηκαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) με την χρήση του στατιστικού πακέτου SAS. Η σύγκριση των μέσων όρων έγινε με την χρήση του L.S.D με πιθανότητα λάθους 5%.

Η ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών μεταξύ των μεταχειρίσεων όσον αφορά την μελέτη της βλαστικότητας του ζιζανίου, εξετάστηκε τόσο στο σύνολο των τιμών όλων των συνθηκών όσο και τμηματικά σε κάθε θερμοκρασία και φωτοπερίοδο. Επίσης ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), πραγματοποιήθηκε στους μέσους όρους των τιμών που εξέφρασαν την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιήθηκαν τόσο σε συνθήκες αγρού όσο και σε συνθήκες εργαστηρίου.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Βιολογία

Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε μελέτη των συνθηκών βλάστησης των σπόρων του φυτού καθώς και μελέτης της βιολογίας και του χρόνου εμφάνισης των σημαντικότερων φαινολογικών σταδίων του φυτού σε συνθήκες αγρού. Ο προσδιορισμός του χρόνου εμφάνισης των σημαντικότερων φαινολογικών σταδίων του φυτού υπολογίστηκε σε ημέρες από την σπορά και έγινε με την βοήθεια της κλίμακας B.B.C.H.

5.1.1 Βλαστικότητα

Όπως αναφέρθηκε στα Υλικά και Μέθοδοι, η μελέτη της βλαστικότητας των σπόρων τεσσάρων βιότυπων τάτουλα πραγματοποιήθηκε σε ελεγχόμενες συνθήκες φωτοπεριόδου (24 ώρες σκοτάδι στην μία συνθήκη και 8 ώρες φως/ 16 ώρες σκοτάδι στην άλλη) και θερμοκρασίας (25° C και 15°). Οι σπόροι (Εικόνα 3) που χρησιμοποιήθηκαν για τους τέσσερις βιότυπους είχαν συλλεχθεί από τον αγρό το 2006 και το 2005.

Ο πράσινος κανονικός βιότυπος (Π.Κ) του 2006 παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης (>80%) στην μεταχείριση τρίψιμο και GA₃ σε όλες τις συνθήκες. Στις υπόλοιπες δύο μεταχειρίσεις τα ποσοστά βλάστησης των σπόρων δεν ήταν αρκετά υψηλά. Τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης για όλες τις μεταχειρίσεις εκτός από την μεταχείριση KNO₃ παρατηρούνται στην θερμοκρασία των 25° C και για τις δύο φωτοπεριόδους (Πίνακας 4).

Πίνακας 4.Βλαστικότητα (%) σπόρου Π.Κ (2006) τάτουλα σε δύο θερμοκρασίες (25° C , 15° C) και δυο φωτοπερίόδους(24 h σκοτάδι, 8 h/16 h φως/ σκοτάδι).

Π.Κ 06	Βλαστικότητα, %			
Μεταχείριση	Φωτοπερίοδος			
	24 h σκοτάδι		8h /16 h φως/σκοτάδι	
	15° C	25° C	15° C	25° C
Τρίψιμο και GA ₃	85	85	81,6	91,6
KNO ₃	56,6	41,6	33,3	55
H ₂ SO ₄	31,6	38,3	31,6	35
L.S.D	17,9	21,3	25,8	12
C.V	15	19	26	10

Ο πράσινος μεγαλόφυλλος βιότυπος (Π.Μ) παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης (61-67%) στην μεταχείριση τρίψιμο και GA₃ σε όλες τις συνθήκες, ενώ η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές στις άλλες δυο μεταχειρίσεις των οποίων τα ποσοστά βλάστησης κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα. Τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης αυτού του βιότυπου για την πρώτη μεταχείριση εντοπίστηκαν σε συνθήκες σκότους και χαμηλής θερμοκρασίας (Πίνακας 5).

Πίνακας 5.Βλαστικότητα (%) σπόρου Π.Μ (2006) τάτουλα σε δύο θερμοκρασίες (25° C , 15° C) και δυο φωτοπερίόδους(24 h σκοτάδι, 8 h/16 h φως/ σκοτάδι).

Π.Μ 06	Βλαστικότητα, %			
Μεταχείριση	Φωτοπερίοδος			
	24 h σκοτάδι		8h /16 h φως/σκοτάδι	
	15° C	25° C	15° C	25° C
Τρίψιμο και GA ₃	70	73,3	61,67	61,6
KNO ₃	38,3	40	38,3	55
H ₂ SO ₄	36,6	26,6	15,3	28,3
L.S.D	21,3	11	27,4	15,9
C.V	22	12	36	16

Ο κόκκινος κανονικός βιότυπος (Κ.Κ) του 2006 παρουσίασε επίσης τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης στην μεταχείριση τρίψιμο και GA₃ και το υψηλότερο

ποσοστό βλάστησης στους 25° C και σε συνθήκες σκότους. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως και για τις άλλες δυο μεταχειρίσεις τα υψηλότερα ποσοστά βλάστησης παρατηρούνται στους 25° C γεγονός που έχει λογική εξήγηση αφού το φυτό είναι εαρινό ζιζάνιο (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Βλαστικότητα (%) σπόρου Κ.Κ (2006) τάνουλα σε δύο θερμοκρασίες (25° C , 15° C) και δυο φωτοπερίόδους(24 h σκοτάδι, 8 h/16 h φως/ σκοτάδι).

Κ.Κ 06	Βλαστικότητα, %			
	Φωτοπερίοδος			
Μεταχείριση	24 h σκοτάδι		8h /16 h φως/σκοτάδι	
	15° C	25° C	15° C	25° C
Τρίψιμο και GA ₃	68,3	85	68,3	81,6
KNO ₃	45	58,3	38,3	43,3
HSO ₄	28,3	38,3	15	28,3
L.S.D	13,7	12,4	24,2	12,8
C.V	14	10	29	12

Ο κόκκινος μεγαλόφυλλος βιότυπος (Κ.Μ) δεν παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βλάστησης σε καμία μεταχείριση. Εμφάνισε σχετικά υψηλά ποσοστά βλάστησης (71,6%) στην μεταχείριση στην μεταχείριση τρίψιμο και GA₃ σε συνθήκες σκότους και υψηλής θερμοκρασίας. Για όλες τις άλλες συνθήκες η βλαστικότητα του βιότυπου ήταν μέτρια έως χαμηλή με την χαμηλότερη τιμή (25%) να εντοπίζεται στην μεταχείριση HSO₄ σε συνθήκες σκότους και χαμηλής θερμοκρασίας (Πίνακας 7).



Εικόνα 3. Σπόροι του φυτού *Datura stramonium*

Πίνακας 7. Βλαστικότητα (%) σπόρου K.M (2006) τάτουλα σε δύο θερμοκρασίες (25° C , 15° C) και δυο φωτοπερίόδους(24 h σκοτάδι, 8 h/16 h φως/ σκοτάδι).

K.M 06	Βλαστικότητα, %			
Μεταχείριση	Φωτοπερίοδος			
	24 h σκοτάδι		8h /16 h φως/σκοτάδι	
	15° C	25° C	15° C	25° C
Τρίψιμο και GA ₃	56,6	71,6	63,3	50
KNO ₃	33,6	46,6	33,3	31,6
H ₂ SO ₄	25	27,5	23,3	31,6
L.S.D	24,2	14,6	11,5	22,8
C.V	31	15	14	30

Αν γίνει μια σύγκριση μεταξύ της βλαστικότητας των σπόρων των τεσσάρων βιοτύπων(πίνακας 4-7) προκύπτει ότι και οι τέσσερις βιότυποι παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά βλαστικότητάς όταν έγινε εφαρμογή σε αυτούς γιβεργιλλικού οξέος αφού είχε προηγηθεί τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Κανένας από τους τέσσερις βιοτύπους δεν παρουσίασε ποσοστά βλάστησης πάνω από 70% σε καμία από τις άλλες μεταχειρίσεις. Από όλους τους βιότυπους τα υψηλότερα ποσοστά βλαστικότητας σε όλες τις μεταχειρίσεις είχε ο πράσινος κανονικός βιότυπος, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά βλαστικότητας παρουσίασε ο κόκκινος μεγαλόφυλλος βιότυπος. Παρόμοια συμπεράσματα όσον αφορά την μεταχείριση τρίψιμο και GA₃ για την διακοπή του ληθάργου των σπόρων του τάτουλα βρέθηκαν από την Νικολαΐδου το 2006.

Η μελέτη της βλαστικότητας των σπόρων τάτουλα οι οποίοι είχαν συλλεχθεί το 2005 δείχνει ότι τόσο ο πράσινος όσο και ο κόκκινος βιότυπος παρουσίασαν υψηλά ποσοστά βλαστικότητας έως και πάνω από 90%(πίνακας 8 και 9). Εκτός από την μεταχείριση τρίψιμο και GA₃ οι συγκεκριμένοι βιότυποι παρουσιάζουν πολύ μεγάλη βλαστικότητα και στην μεταχείριση KNO₃. Για την συγκεκριμένη μεταχείριση τα ποσοστά βλαστικότητας των σπόρων στην θερμοκρασία των 25° C κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα (>85%). Οι συγκεκριμένοι βιότυποι δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βλάστησης όταν εμβαιπίστηκαν οι σπόροι τους σε διάλυμα H₂SO₄ (Πίνακας 8).

Αν γίνει μια σύγκριση της βλαστικότητας μεταξύ του πράσινου κανονικού βιότυπου του 2006 (πίνακας 4) και του πράσινου κανονικού του 2005 (Πίνακας 8) προκύπτει ότι ο πράσινος κανονικός βιότυπος του 2005 είχε υψηλότερα ποσοστά βλαστικότητας σε όλες τις μεταχειρίσεις. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν εάν γίνει σύγκριση μεταξύ του κόκκινου κανονικού βιότυπου του 2006 (πίνακας 5) και του κόκκινου κανονικού βιότυπου του 2005 (Πίνακας 9). Από αυτές τις συγκρίσεις φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια σχέση μεταξύ της ηλικίας του σπόρου και της βλαστικότητας που παρουσιάζει. Δηλαδή προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι σπόροι οι οποίοι έχουν αποθηκευτεί ένα χρόνο παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά βλαστικότητας σε σχέση με εκείνους που μόλις έχουν συλλεχθεί.

Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν και με σπόρο τάτουλα που είχε συλλεχθεί 1-2 χρόνια πριν να σημειώσουν υψηλότερα ποσοστά βλάστησης από φρέσκους σπόρους τις ίδιες χρονιάς (Andersen, 1968). Βέβαια η διαπίστωση αυτή δεν είναι απόλυτη γιατί για να υπάρξει επιτυχημένη διακοπή του ληθάργου των σπόρων του τάτουλα θα πρέπει οι σπόροι να έχουν συλλεχθεί σε πρώιμο στάδιο όπου το περισπέρμιό τους είναι μαλακότερο από ότι σε όψιμο στάδιο.

Πίνακας 8.Βλαστικότητα (%) σπόρου Π.Κ (2005) τάτουλα σε δύο θερμοκρασίες (25° C , 15° C) και δυο φωτοπεριόδους(24 h σκοτάδι, 8 h/16 h φως/ σκοτάδι).

Π.Κ 05	Βλαστικότητα, %			
Μεταχείριση	Φωτοπερίοδος			
	24 h σκοτάδι		8h /16 h φως/σκοτάδι	
	15° C	25° C	15° C	25° C
Τρίψιμο και GA ₃	86,6	96,6	90	98,3
KNO ₃	76,6	91,6	75	95
H ₂ SO ₄	30	41,6	41,6	43,3
L.S.D	22,8	8,1	24	11
C.V	17	5	17	7

Πίνακας 9 Βλαστικότητα (%) σπόρου Κ.Κ (2006) τάτουλα σε δύο θερμοκρασίες (25° C , 15° C) και δυο φωτοπεριόδους(24 h σκοτάδι, 8 h/16 h φως/ σκοτάδι).

Κ.Κ 05	Βλαστικότητα, %			
Μεταχείριση	Φωτοπερίοδος			
	24 h σκοτάδι		8h /16 h φως/σκοτάδι	
	15° C	25° C	15° C	25° C
Τρίψιμο και GA ₃	71,6	98,3	83,3	85
KNO ₃	68,3	85	80	80
H ₂ SO ₄	33,3	36,6	48,3	48,3
L.S.D	17,30	7,44	25,57	18,54
C.V	15	5	18	13


5.1.2 Ρυθμός βλάστησης

Παραπάνω έγινε αναφορά στο ποιες ήταν οι καλύτερες συνθήκες βλάστησης για τους τέσσερις βιοτύπους τάτουλα καθώς και στην επίδραση της ηλικίας αποθήκευσης στην βλάστηση των σπόρων. Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στον ρυθμό βλάστησης των σπόρων, δηλαδή στο πόσο γρήγορα επιτυγχάνεται η βλάστηση των σπόρων σε κάθε θερμοκρασία και φωτοπερίοδο σε συνδυασμό με τις μεταχειρίσεις του πειράματος.


Στα σχήματα 2-7 γίνεται μια σύγκριση στο κατά πόσο επιδρά η θερμοκρασία στον ρυθμό βλάστησης των σπόρων. Τα σχήματα που παρουσιάζονται αφορούν την μεταχείριση τρίψιμο και εφαρμογή GA₃ 1mg/ml σε θερμοκρασία 25° C και 15° C, σε δύο φωτοπεριόδους (24 h σκοτάδι, 16/8 h σκοτάδι/φως). Από τα σχήματα φαίνεται ξεκάθαρα πως οι σπόροι όλων των βιοτύπων βλάστησαν γρηγορότερα στην θερμοκρασία των 25° C από ότι σε αυτή των 15° C και στις δυο φωτοπεριόδους. Πιο συγκεκριμένα στην μεταχείριση τρίψιμο και εφαρμογή GA₃ 1mg/ml σε θερμοκρασία 25° C σε φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι, όλοι οι βιότυποι ολοκλήρωσαν την βλάστησή τους σε 14 ημέρες σχήμα 1 και 3 ενώ στην ίδια μεταχείριση και φωτοπερίοδο και σε θερμοκρασία 15° C, οι βιότυποι ολοκλήρωσαν την βλάστησή τους σε 22 ημέρες.(σχήμα 2 και 4)

Άλλο ένα γεγονός που αξίζει να αναφερθεί είναι πως σε όλες τις μεταχειρίσεις (σχήμα 1-6) και στις δύο θερμοκρασίες και φωτοπεριόδους, οι σπόροι των βιοτύπων οι οποίοι είχαν συλλεχθεί από τον αγρό το 2005 παρουσίασαν υψηλότερο ρυθμό


βλάστησης σε σχέση με τους σπόρους των βιοτύπων που συλλέχθηκαν το 2006(σχήμα 5-6). Σε θερμοκρασία 25° C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι και μεταχείριση 0,2% KNO₃ οι βιότυποι του 2005(Πράσινος κανονικός και Κόκκινος κανονικός) ολοκλήρωσαν την βλάστησή τους γρηγορότερα από τους ίδιους βιότυπους οι οποίοι είχαν συλλεχθεί το 2006(πίνακας 5 και 6). Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι βιότυποι που συλλέχθηκαν το 2005 είχαν μαλακότερο περισπέρμιο, είχαν δηλαδή συλλεχθεί πιο πρώιμα σε σχέση με τους βιότυπους του 2006 ή στο ότι με την ηλικία μειώνεται ο λήθαργος του σπόρου.




Σχήμα 1. Ρυθμός βλάστησης τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα(4 βιότυποι συλλέχθηκαν το 2006 και 2 το 2005) μετά από τρίψιμο και εφαρμογή GA₃ 1mg/ml σε θερμοκρασία 25° C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι.




Σχήμα 2. Ρυθμός βλάστησης σπόρου τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα (4 βιότυποι συλλέχθηκαν το 2006 και 2 το 2005) μετά από τρίψιμο και εφαρμογή GA₃ 1mg/mL σε θερμοκρασία 15° C και φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι.




Σχήμα 3. Ρυθμός βλάστησης σπόρου τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα (4 βιότυποι συλλέχθηκαν το 2006 και 2 το 2005) μετά από τρίψιμο και εφαρμογή GA₃ 1mg/mL σε θερμοκρασία 25° C και φωτοπερίοδο 16/8 h σκοτάδι/φως.



Σχήμα 4. Ρυθμός βλάστησης σπόρου τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα (4 βιότυποι συλλέχθηκαν το 2006 και 2 το 2005) μετά από τρίψιμο και εφαρμογή GA₃ 1mg/mL σε θερμοκρασία 15° C και φωτοπερίοδο 16/8 h σκοτάδι/φως.



Σχήμα 5. Ρυθμός βλάστησης σπόρου τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα (4 βιότυποι συλλέχθηκαν το 2006 και 2 το 2005) μετά από τρίψιμο και εφαρμογή 0,2% KNO₃ σε θερμοκρασία 25° C και φωτοπερίοδο 16 h σκοτάδι.



Σχήμα 6. Ρυθμός βλάστησης τεσσάρων βιοτόπων λάτουλα (4 βιότυποι συλλέχθηκαν το 2006 και 2 το 2005) μετά από τρίψιμο και εφαρμογή 0,2% KNO_3 σε θερμοκρασία $15^{\circ}C$ και φωτοπερίοδο 16 h σκοτάδι.

5.1.3 Βιολογικός κύκλος και στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου

Η μελέτη της βιολογίας των τεσσάρων βιοτύπων του ζιζανίου έγινε στον αγρό στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Τα σημαντικότερα στάδια ανάπτυξης του φυτού μετρήθηκαν σύμφωνα με την κλίμακα Β.Β.С.Н. Τα χρονικά διαστήματα εμφάνισης του κάθε σταδίου ανάπτυξης μετρήθηκαν σε μέρες μετά την σπορά (Η.Μ.Σ). Τα αποτελέσματα της βιολογίας για τους τέσσερις βιότυπους τάτουλα φαίνονται στον Πίνακα 10.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, τον μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο παρουσίασε ο Κ.Μ βιότυπος με 209 ημέρες ζωής και τον μικρότερο βιολογικό κύκλο παρουσίασε ο Π.Μ βιότυπος (118 Η.Μ.Σ). Ο Π.Κ βιότυπος ο οποίος είχε προέλευση το Βελεστίνο συμπλήρωσε τον βιολογικό του κύκλο σε 186 ημέρες, ενώ ο Κ.Κ βιότυπος με προέλευση το Βελεστίνο σε 174 ημέρες.

Επίσης από τον πίνακα 10 φαίνεται πως στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών οι ημερομηνίες εμφάνισης των φαινολογικών σταδίων ήταν παρόμοιες για όλους τους τέσσερις βιοτύπους και η διαφοροποίηση παρατηρήθηκε από την εμφάνιση του πέμπτου μόνιμου πραγματικού φύλλου και μετά.

Στον Κ.Μ βιότυπο οι κοτυληδόνες του εμφανίστηκαν 25 Η.Μ.Σ, η έναρξη της ανθοφορίας 93 Η.Μ.Σ, ενώ η εμφάνιση καρπού 118 Η.Μ.Σ και η ολοκλήρωση του βιολογικού του κύκλου το τέλος Νοεμβρίου 209 Η.Μ.Σ

Στον Π.Μ βιότυπο οι κοτυληδόνες του εμφανίστηκαν 24 Η.Μ.Σ και η έναρξη της ανθοφορίας 79 Η.Μ.Σ. Εμφάνισε τους πρώτους του καρπούς 98 ημέρες μετά την σπορά και ολοκλήρωσε τον βιολογικό του κύκλο σε 158 Η.Μ.Σ ζήσει 51 ημέρες λιγότερο από ότι ο Κ.Μ βιότυπος. Στην Εικόνα 4 διακρίνονται φυτά τάτουλα πράσινων και κόκκινων βιοτύπων.

Στον Π.Κ βιότυπος εμφάνισε τις κοτυληδόνες του 23 Η.Μ.Σ, το πρώτο άνθος 85 Η.Μ.Σ, εμφάνισε καρπούς 109 Η.Μ.Σ και ολοκλήρωσε τον βιολογικό του κύκλο σε 186 ημέρες. Σύμφωνα με την Νικολαΐδου (2006) ο συγκεκριμένος βιότυπος ολοκλήρωσε τον βιολογικό του κύκλο σε 192 ημέρες. Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο βιολογικός κύκλος του συγκεκριμένου ζιζανίου διαρκεί από 185 έως 195 Η.Μ.Σ, στις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην περιοχή του Βελεστίνου.

Τα αποτελέσματα μελέτης του βιολογικού κύκλου του Κ.Κ βιότυπου τάτουλα έδειξαν ότι το φυτό ολοκληρώνει τον βιολογικό του κύκλο σε 174 Η.Μ.Σ. Η έναρξη

της ανθοφορίας του ξεκίνησε σε 87 Η.Μ.Σ ενώ εμφάνισε καρπούς 102 Η.Μ.Σ. Πιο σύντομος ήταν ο βιολογικός κύκλος του συγκεκριμένου βιότυπου όταν τον μελέτησε η Νικολαΐδου το 2006 αφού ολοκλήρωσε τον βιολογικό του κύκλο σε 159 Η.Μ.Σ ενώ εμφάνισε καρπούς 62 Η.Μ.Σ.

Πίνακας 10:Μερικά Στάδια ανάπτυξης και εμφάνισή τους σε ημέρες από την σπορά των τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα

Κωδικός σταδίου	Περιγραφή Ημέρες από σπορά	Βιότυποι τάτουλα			
		Κ.Μ	Π.Μ	Π.Κ	Κ.Κ
0	Σπορά	0	0	0	0
10	Εμφάνιση κοτυληδόνων	25	24	23	25
11	1ο φύλλο	34	32	33	33
13	3ο φύλλο	41	39	40	40
15	5ο φύλλο	46	48	51	47
31	1ο Μ.Δ.	63	58	66	59
33	3ο Μ.Δ.	70	65	74	67
35	5ο Μ.Δ.	78	70	82	71
51	Έναρξη έκπτυξης άνθους	94	79	85	87
59	Πλήρης έκπτυξη άνθους	99	85	96	90
71	Εμφάνιση καρπών	118	98	109	102
81	Έναρξη ωρίμανσης καρπών	137	122	127	117
89	Πλήρης ωρίμανση καρπών	141	125	132	121
97	Θάνατος φυτού	209	158	186	174



Εικόνα 4. Πράσινος και κόκκινος βιότυπος

5.2 Μορφολογία Τάτουλα

Παράλληλα με τη μελέτη του βιολογικού κύκλου του ζιζανίου στον αγρό έγινε και μελέτη ορισμένων μορφολογικών χαρακτηριστικών του ζιζανίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ίδια φυτά στα οποία μελετήθηκε και η βιολογία του φυτού.

Οι **κοτυληδόνες** του ζιζανίου στους τέσσερις βιότοπους ήταν μακριές, λογχοειδούς σχήματος και παρουσίαζαν μια έντονη αυλάκωση στην πάνω επιφάνεια (Εικόνα 5). Τα **φύλλα** του τάτουλα ήταν έμμισχα είχαν σχήμα τριγωνικό ωοειδές και στην περιφέρειά τους ήταν οδοντωτά, ενώ το χρώμα τους ήταν σκούρο πράσινο. Οι νευρώσεις των φύλλων για τους κόκκινους βιότυπους ήταν κοκκινωπές ενώ στους πράσινους βιότυπους είχαν χρώμα ανοιχτό πράσινο. Το μέγεθος των φύλλων μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλο. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι όλο το φυτό αλλά ιδιαίτερα η επαφή με τα φύλλα του προσέδιδε μια χαρακτηριστική έντονη οσμή. Οι μορφολογικές μετρήσεις που έγιναν αφορούσαν τις διαστάσεις του 1^{ου} πραγματικού φύλλου όπως αυτό ήταν στο τελικό ύψος του φυτού. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των διαστάσεων του πρώτου πραγματικού φύλλου για κάθε βιότυπο φαίνονται στον Πίνακα 11 που ακολουθεί. Από τις τιμές του πίνακα προκύπτει το συμπέρασμα ότι τις μεγαλύτερες διαστάσεις 1^{ου} πραγματικού φύλλου τις έχει ο Π.Μ βιότυπος και στην συνέχεια ο ΚΜ βιότυπος. Οι τιμές που παρουσίασαν ο Π.Κ και ο Κ.Κ βιότυπος ήταν παρόμοιες.



Εικόνα 5. Οι κοτυληδόνες του φυτού τάτουλας.

Πίνακας 11. Διαστάσεις 1^{ου} πραγματικού φύλλου τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα.

βλαστικότητα	Μήκος Φύλλου (cm)	Πλάτος Φύλλου (cm)	Μήκος Μίσχου (cm)
Κόκκινος Μεγαλόφυλλος	7,7	2,9	2,7
Κόκκινος Κανονικός	6,3	2,2	2,5
Πράσινος Μεγαλόφυλλος	8,1	3,2	3,0
Πράσινος Κανονικός	6,6	2,3	2,5

Το άνθος του τάτουλα είχε σχήμα χωνιού και το μέγεθός του είναι αρκετά μεγάλο (Εικόνα 6). Για τους κόκκινους βιότυπους στη βάση του άνθους παρατηρήθηκε ένας μωβ και κόκκινος χρωματισμός, ενώ στους πράσινους βιότυπους το χρώμα του άνθους ήταν ολόλευκό. Για τους κόκκινους βιότυπους και ιδιαίτερα για τον Κ.Μ βιότυπο τα άνθη ήταν μεγαλύτερα σε σχέση με τα άνθη των πράσινων βιοτύπων. Στους κόκκινους βιοτύπους η διάμετρος της στεφάνης ήταν από 5,8 έως 6,7 cm, ενώ στους πράσινους από 5,0 έως 6,0 cm. Το μήκος του μίσχου ήταν παρόμοιο για όλους τους βιότυπους από 1,1 έως 1,3 cm. Το μήκος των πετάλων των κόκκινων βιοτύπων κυμαίνονταν από 5,0 έως 5,8 cm ενώ των πράσινων βιοτύπων από 3,9 έως 4,5 cm.



Εικόνα 6. Το άνθος των πράσινων και το άνθος των κόκκινων βιοτύπων τάτουλα.

Ο βλαστός του τάτουλα (Εικόνα 7) ήταν λείος, όρθιος, χονδρός ενώ οι βραχίονες του διακλαδίζονται και στην βάση των διακλαδώσεων εμφανίζουν ένα φύλλο και ένα άνθος. Οι μορφολογικές παρατηρήσεις που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία αφορούσαν το μήκος του 1^{ου}, 3^{ου} και 5^{ου} μεσογονατίου διαστήματος για κάθε βιότυπο καθώς και το τελικό ύψος του κάθε βιοτύπου.

Από τους Πίνακες 2 και 3 προκύπτει το συμπέρασμα ότι όλοι οι βιότυποι είχαν περίπου το ίδιο ύψος εκτός από τον βιότυπο Π.Κ. Όλοι οι βιότυποι είχαν σπαρθεί την ίδια ημέρα και δέχτηκαν τις ίδιες μεταχειρίσεις όσον αφορά τις καλλιεργητικές φροντίδες (άρδευση και βοτάνισμα). Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα της μελέτης της βιολογίας του τάτουλα που διεξήγαγε η Νικολαΐδου το 2006, όπου υψηλότερες τιμές ύψους φυτών παρουσίασε ο Κ.Κ βιότυπος.

Πίνακας 12. Μήκος 1^{ου}, 3^{ου} και 5^{ου} μεσογονατίου διαστήματος τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα

βλαστικότητα	1^ο Μ.Δ (cm)	3^ο Μ.Δ (cm)	5^ο Μ.Δ (cm)
Κόκκινος Μεγαλόφυλλος	3,41	3,67	4,15
Κόκκινος Κανονικός	3,17	3,21	4,46
Πράσινος Μεγαλόφυλλος	2,55	2,89	4,12
Πράσινος Κανονικός	2,15	2,45	3,73


Πίνακας 13. Τελικό ύψος φυτών τεσσάρων βιοτύπων τάτουλα

βλαστικότητα	ΥΨΟΣ ΦΥΤΟΥ (cm)
Κόκκινος Μεγαλόφυλλος	161
Κόκκινος Κανονικός	172
Πράσινος Μεγαλόφυλλος	176
Πράσινος Κανονικός	120



Εικόνα 7. Βλαστός και άνθη πράσινου βιότυπου τάτουλα

Ο **καρπός** του τάτουλα είναι κάψα και περιβάλλεται από αγκάθια (Εικόνα 8). Το μέγεθος του καρπού του τάτουλα είναι περίπου όσο ένα καρύδι. Το χρώμα των σπόρων για κάθε βιότυπο ήταν μαύρο ή ανοιχτό καφέ ανάλογα με την περίοδο παρατήρησης. Οι πρώιμοι σπόροι είχαν χρώμα καφέ ενώ οι πιο όψιμοι σπόροι είχαν χρώμα μαύρο. Το σχήμα των σπόρων και των τεσσάρων βιοτύπων ήταν νεφροειδές (Εικόνα 9). Ο κόκκινος μεγαλόφυλλος παρουσίασε κατά μέσο όρο 460 σπόρους ανά κάψα με μέσο βάρος σπόρου 0,0063 g. Ο κόκκινος κανονικός βιότυπος είχε 500 σπόρους κατά μέσο όρο ανά κάψα και το μέσο βάρος των σπόρων του ήταν 0,0067 g.



Εικόνα 8. Καρπός τάτουλα



Εικόνα 9. Σπόροι τάτουλα

Οι δύο πράσινοι βιότυποι είχαν λιγότερους σπόρους σε κάθε κάψα αλλά ήταν ελαφρώς βαρύτεροι σε σχέση με τους σπόρους των κόκκινων βιοτύπων. Ο πράσινος κανονικός βιότυπος είχε κατά μέσο όρο 380 σπόρους ανά κάψα με μέσο βάρος σπόρου 0,0072 g. Ο πράσινος μεγαλόφυλλος βιότυπος είχε 350 σπόρους ανά κάψα με μέσο βάρος σπόρου 0,0076 g.

5.3 Χημική αντιμετώπιση

5.3.1 Πείραμα στον αγρό

Στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην περιοχή Βελεστίνου Μαγνησίας αξιολογήθηκαν εννέα ζιζανιοκτόνα, εκ των οποίων πέντε ήταν προφυτρωτικά, τρία μεταφυτρωτικά και ένα ενσωματούμενο. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή του πειράματος ήταν των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων (RCB), με τρεις επαναλήψεις για κάθε μεταχείριση.

Πάρα πολύ καλό έλεγχο για τον Π.Κ βιότυπο σε συνθήκες αγρού έδωσαν τα ζιζανιοκτόνα dimethenamid (91%), isoxaflutole (90%) acetochlor (86%) και τα μεταφυτρωτικά mesotrione και sulcotrione σε ποσοστά 88% και 86% αντίστοιχα. Μέτριο έλεγχο του Π.Κ βιότυπου εμφάνισαν τα ζιζανιοκτόνα aclonifen (63%), napropamide (63%) και το μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο foramsulfuron (73%). Το ζιζανιοκτόνο trifluralin δεν έδωσε τόσο καλά αποτελέσματα ελέγχου του ζιζανίου (43%). Επίσης τα ζιζανιοκτόνα acetochlor, isoxaflutole, dimethenamid, mesotrione και sulcotrione ελέγχου σε πολύ υψηλό ποσοστό και τους υπόλοιπους τρεις βιοτύπους όπως φαίνεται αναλυτικά στα Σχήματα 7-10.


Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της Π. Νικολαΐδου (2006) η οποία βρήκε ότι έλεγχο στο ζιζάνιο τάτουλας μεγαλύτερο από 75% προσφέρουν τα

ζιζανιοκτόνα acetochlor, isoxaflutole, dimethenamid, mesotrione+acetochlor, mesotrione και το imazamox.


5.3.2 Πείραμα στο εργαστήριο

Τα ίδια ζιζανιοκτόνα αξιολογήθηκαν επίσης σε συνθήκες εργαστηρίου σε κατάλληλα φυτοδοχεία. Το πείραμα για την αξιολόγηση των ζιζανιοκτόνων στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας πραγματοποιήθηκε δυο φορές.


Όσον αφορά την χημική αντιμετώπιση του Κ.Μ βιότυπου τα ζιζανιοκτόνα dimethenamid (90%), acetochlor (86%) και isoxaflutole (86%) έλεγξαν σε πολύ καλό ποσοστό τον συγκεκριμένο βιότυπο. Μέτρια αποτελέσματα έδωσαν τα ζιζανιοκτόνα foramsulfuron (70%), sulcotrione (63%), mesotrione (60%) και το aclonifen (54%). Καθόλου καλό έλεγχο δεν έδωσαν τα ζιζανιοκτόνα trifluralin (36%) και napropamide (26%). Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα σε συνθήκες εργαστηρίου και για τους άλλους τρεις βιότυπους (σχήματα 7-10). Η μέτρια αποτελεσματικότητα που έδωσαν τα μεταφαιτρωτικά ζιζανιοκτόνα mesotrione και sulcotrione σε αντίθεση με τις συνθήκες αγρού όπου έδωσαν πολύ καλά αποτελέσματα, πιθανόν να οφείλεται στην εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων με ψεκαστήρες χειρός. Κατά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων με αυτούς τους ψεκαστήρες παρατηρήθηκε μικρή απορροή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος.




Σχήμα 7. Αποτελεσματικότητα ζιζανιοκτόνων στον έλεγχο του Π.Κ βιότυπου του ζιζανίου τάτουλας



Σχήμα 8. Αποτελεσματικότητα ζιζανιοκτόνων στον έλεγχο του Π.Μ βιότυπου του ζιζανίου τάτουλας



Σχήμα 9. Αποτελεσματικότητα ζιζανιοκτόνων στον έλεγχο του Κ.Κ βιότυπου του ζιζανίου τάτουλας



Σχήμα 10. Αποτελεσματικότητα ζιζανιοκτόνων στον έλεγχο του Κ.Μ βιότυπου του ζιζανίου τάτουλας

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την μελέτη της βιολογίας του φυτού που έγινε στο εργαστήριο βρέθηκε ότι η καλύτερη μεταχείριση για να βλαστήσει ο σπόρος του, ήταν η εφαρμογή GA₃ (Γιβεριλλικό οξύ) 1mg/mL μετά από τρίψιμο του σπόρου με γυαλόχαρτο. Επίσης, ο σπόρος βλαστήσε σε μεγαλύτερο ποσοστό και ρυθμό σε θερμοκρασία 25° C, γεγονός που δικαιολογεί και την κατάταξή του ως εαρινό ζιζάνιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της βιολογίας του τάτουλα φαίνεται πως υπάρχει μια επίδραση της ηλικίας των σπόρων στην βλάστηση, αφού οι σπόροι που συλλέχθηκαν το 2005 εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά βλαστικότητας σε σχέση με τους σπόρους που συλλέχθηκαν το 2006.

Ακόμη από την μελέτη της βιολογίας του τάτουλα που έγινε στον αγρό το φυτό ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο σε διάστημα 158 – 209 ημερών μετά την σπορά αναλόγως του βιότυπου. Τον μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο παρουσίασε ο κόκκινος μεγαλόφυλλος βιότυπος, ο οποίος έδειξε να προσαρμόζεται καλύτερα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Αγρόκτημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Βελεστίνο. Όλοι οι βιότυποι άρχισαν να διαφοροποιούν τον βιολογικό τους κύκλο από την εμφάνιση του πέμπτου μόνιμου πραγματικού φύλλου και μετά

Σύμφωνα με τις μορφολογικές παρατηρήσεις που πάρθηκαν οι βιότυποι δεν διάφεραν πολύ μεταξύ τους. Οι μόνες διαφορές που παρατηρήθηκαν αφορούσαν το χρώμα του βλαστού και των ανθέων και το μέγεθος των φύλλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων οι μεγαλόφυλλοι βιότυποι παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερα τα φύλλα τους σε σχέση με τους κανονικούς βιότυπους, γεγονός που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό εάν δεν παρθούν επιμέρους μετρήσεις. Επίσης ψηλότερος φαίνεται να είναι ο Π.Μ βιότυπος ο οποίος έφτασε σε ύψος τα 176 cm.

Από το πείραμα σε συνθήκες αγρού και εργαστηρίου όπου αξιολογήθηκαν 5 προφυτρωτικά, 1 ενσωματούμενο και 3 μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Βρέθηκε ότι καλό έλεγχο > 85% σε όλους τους βιότυπους του τάτουλα έδωσαν τα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα acetochlor, dimethenamid, isoxaflutole και τα μεταφυτρωτικά mesotrione και sulcotrione. Οι βιότυποι δεν διέφεραν ως προς τον έλεγχό τους στα ζιζανιοκτόνα.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

Ελευθεροχωρινός, Η. Γ., 1999. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου rygithiobac εναντίον πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια βαμβακιού. Πρακτικά 11^{ου} Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, Βόλος, σελίδα 31.

Ελευθεροχωρινός, Η.Γ., 2002. Ζιζανιολογία - Ζιζάνια – Ζιζανιοκτόνα- Περιβάλλον Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης. Αθήνα. Εκδόσεις Αγρότυπος.

Θρασυβούλου, Α.Θ., 2001. Πρακτική Μελισσοκομία. Προβλήματα, Αιτίες και Λύσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μελισσοκομική Επιθεώρηση.

Καρκάνης, Α, Μπουχάγιερ, Π και Ευθυμιάδης Π, 2006. Επίδραση της άρδευσης στην ανάπτυξη και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της αγριοβμβακιάς (*Abutilon theophrasti*), της αγριοτομάτας (*Solanum nigrum*) και του τάτουλα (*Datura stramonium*). Πρακτικά 14^{ου} Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, Βόλος, σελίδα 31.

Κατσιβας, Α., 1999. isoxaflutole:Νέο ζιζανιοκτόνο για τον αραβόσιτο. Πρακτικά 11^{ου} Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, Βόλος, σελίδα 35.

Λόλας, Π.Χ., 2007. Ζιζάνια - Ζιζανιοκτόνα. Τύχη και συμπεριφορά στο Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 2^η Έκδοση. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.

Νικολαΐδου, Π, Πρίτσα, Θ και Λόλας Π.Χ., 2006. Βιολογία, μορφολογία και χημική αντιμετώπιση τριών βιοτύπων τάτουλα (*Datura stramonium*). Πρακτικά 14^{ου} Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, Βόλος, σελίδα 69.

Παναγόπουλος Χ.Γ., 2000. Ασθένειες Κηπευτικών Καλλιεργειών. Αθήνα 2^η έκδοση. Εκδόσεις Σταμούλη.

Παρέντης, Τ., Βελούκας, Θ., 2004. Equip®: Νέο ζιζανιοκτόνο, με ευρύ φάσμα δράσης για τον αραβόσιτο. Πρακτικά 13^{ου} Πανελληνίου Ζιζανιολογικού Συνεδρίου, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, Ορεστιάδα, σελίδα 13.

Σάρλης, Γ, 1999. Συστηματική Βοτανική. Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλη.

Τάτση, Ε.Ι., Μάνης, Δ.Γ. και Λόλας Π.Χ, 1999. Αξιολόγηση του clomazone (Centium 36CS) ως ζιζανιοκτόνο καπνού. Πρακτικά 11^{ου} Επιστημονικού Συνεδρίου, Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρία, Βόλος, σελίδα 30.

Φασούλας, Α, 1992. Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής. Θεσσαλονίκη.

Ξενογλώσση

- Andersen, R., 1968.** Germination and establishment of weeds for experimental purposes. A Weed Science of America Handbook.
- Berkov, S and Philipov, S, 2002.** Alkaloid Production in Diploid and Autotetraploid Plants of *Datura stramonium*. *Pharmaceutical Biology*, 40:617-622.
- Berkov, S, Doncheva, T, Philipov, S and Alexandrov, K, 2005.** Ontogenetic variation of the tropane alkaloids in *Datura stramonium*». *Biochemical Systematic and Ecology*, 33:1017-1029
- Berkov, S, Zayed, R and Doncheva, T, 2006.** Alkaloid patterns in some varieties of *Datura stramonium*. *Fytoterapia*, 77:179-182
- Cavero, J, Zaragoza, C, Bastiaans, L, Suso, M.L. and Pardon, A, 2000.** The relevance of morphological plasticity in the simulation of competition between maize and *Datura stramonium*. *Weed Research*, 40: 163-180.
- Chatzivasilioy, E.K., Peters, D and Katis, N.I., 2007.** The role of weeds in the spread of Tomato Spotted Wilt Virus by *Thrips tabaci* (Thysanoptera: Thripidae) in tobacco crops. *Journal of Phytopathology*, 155:699-705.
- Clark, J.D., 2005.** The history, complications and treatments of Jimson Weed toxicity. *Top. Emerg. Med.*, 27: 295-301.
- Deng F, 2005.** Effects of glyphosate, chlorsulfuron, and methyl jasmonate on growth and alkaloid biosynthesis of jimsonweed (*Datura stramonium* L.). *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 82:16-26
- Forrester, M.B., 2006.** Jimsonweed (*Datura stramonium*) exposures in Texas, 1998-2004. *Journal of Toxicology and Enviromental Health*, 69:1757-1762.
- Gardner, W.A, 1921.** Effect of Light on Germination of Light-Sensitive Seeds. *Botanical Gazette*, 71:249-288.
- Ghersa, C and Roysh, M, 1993.** Searching for solutions to weed problems. *BioScience*, 43:104-109.
- Hall, D.W., Vandiner, V.V. and Ferrell J.A., 1991.** Jimsonweed, *Datura stramonium* L. *IFAS Extension*, University of Florida.
- Hansen, P and Clerk, B, 2002.** Anisocoria in the dog provoked by a toxic contact with an ornamental plant: *Datura stramonium*. *Veterinary Ophthalmology*, 5:277-279.
- Helwig, D, 1999.** Ontario police warn of jimson weed dangers. *CMAJ:Canadian Medical Association Journal*, 161: 1384

Herbicide Handbook Committee, 2002. Herbicide handbook of the weed science society of America, 8th edition. Weed Science Society of America, Champaign, IL, U.S.A.

Hernandez-Zepeda, C, Idris, A.M., Carnevali, J, Brown, J.K., Moreno-Valenzuela, O.A., 2007. Molecular characterization and experimental host range of Euphorbia mosaic virus-Yucatan Peninsula, a begomovirus species in the Squash leaf curl virus clade. *Plant Pathology*, 56:763-770.

Hess, M., Barralis, G., Bleiholder H., Buhr, L., Eggers, T., Hack, H. and Strauss, R., 1997. Use of the extended BBCH scale-general for the descriptions of the growth stages of mono- and dicotyledonous weed species. *Weed Research*, 37: 433-441.

Hong, N.H, Huan, T.D, Tsuzuki, E, Terao, H, Matsao, M and Khanh, T.D, 2004. Weed control of four higher plant species in Paddy Rice fields in Southeast Asia. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 190: 59-64.

JianHua, Z.M., Salas, L, Jordan, N.R. and Weller S.C., 1999. Biorational approaches to managing *Datura stramonium*. *Weed Science*, 47: 750-756.

Lehoczky, E, Reisinger, P and Komives, T, 2005. Loss of nutrients caused by excessive weediness at the early stage of maize vegetation period. *Communications in Soil Science & Plant Analysis*, 36: 415-422.

Levitt, J, Lovett J.V. and Garlick, P.R., 1984. *Datura stramonium* allelochemicals: longevity in soil and ultrastructural effects on root tip cells of *Heliabthus annuus L.* *New Phytologist*, 97:213-218.

Lovett J.V., Levitt, J and Smith, N.G., 1981. Allelopathic potential of *Datura stramonium L.* (Thorn-Apple). *Weed Research*, 21:165-170.

Manley, B, Wilson, H and Hines , T, 2001. Weed management and crop rotations influence populations of several broadleaf weeds. *Weed Science*, 49:106-122.

Mendel, F, 2004. Analysis of biologically active compounds in potatoes (*Solanum tuberosum*), tomatoes (*Lycopersicon esculentum*), and jimson weed (*Datura stramonium*) seeds. *Journal of Chromatography A*, 1054: 143-155.

Montanya, S.I and Ponce R.G, 2006. Competition for nitrogen between thorn apple and tomato and pepper. *Journal of Plant Nutritio*, 29:565-574.

Mortimer A.M., 1997, The biology of weeds. Weed Control Handbook.

Mountain, W.L., 1987. Jimsonweed, *Datura stramonium L.* *Regulatory Horticulture*, 13. Pennsylvania Department of Agriculture Bureau of Plant Industry.


- Narwal, S.S., 1994.** Allelopathy in crop production. *Scientific Publ.*, Jodhpur, India, 135-136.
- Nunez-Farfan, J and Dirzo, R, 1994.** Evolutionary ecology of *Datura stramonium* L. in central Mexico: Natural selection for resistance to herbivorous insects. *Evolution*, 48:423-436.
- Ormeno, J, Sepulveda, P, Rojas, R and Araya J.E., 2006.** *Datura* genus weeds as an epidemiological factor of *Alfalfa mosaic virus* (AMV), *Cucumber mosaic virus* (CMV) and *Potato virus Y* (PVY) on Solanaceus crops. *Agricultura tecnica*, 66: 333-341.
- Oudhia, P.,2000** Allelopathic research on rice seeds in Chhattisgarh(India) region: An overview. *Advances in Agricultural Research in India* 15:69-80
- Pretorius, E and Marx, J, 2006.** *Datura stramonium* in asthma treatment and possible effects on prenatal development. *Environmental Toxicology and Pharmacology*,21:331-337.
- Sanseovic T, 1998.** Weeds and weed management in tomato. Details from single countries.
- Sancez, R.A, Sunell, L, Lebavitch, J.M and Bonner, B.A, 1990.** Changes in the endosperm cell walls of two *Datura* species before radicle protrusion. *Plant Physiology*, 93:89-97.
- Satina, S and Blakeslee, A.F, 1937.** Chromosome Behavior in Triploids of *Datura stramonium*. I. The Male Gametophyte» *American Journal of Botany*, 24:518-527
- Soler-Rodriguez, F, Martin, A, Garcia-Camero, J.P., Oropesa, A.L. and Perez-Lopez, M, 2006.** *Datura stramonium* poisoning in horses: a risk factor for colic. *Veterinary Record:Journal of the British Veterinary Association*,158:132-133.
- Scott, G.H., Wilcut, W.J., Askew, S.D., 1999.** Jimsonweed (*Datura stramonium*) interference and seed-rain dynamics in cotton. Proceedings of the WSSNC Seventeenth Annual Meeting. Weed Science Society of North Carolina.
- Scott, G.H., Askew, S.D., Wilcut, W.J. and Brownie, C, 2000.** *Datura stramonium* interference and seed rain in *Gossypium hirsutum*. *Weed Science*, 48:613-617.
- Shultz-Schaeffer J, 1980.** *CYTOGENETICS: Plants, Animals, Humans*, Springer-Verlag Heildelrberg
- Talaty,N.,Z., Takats,and R.G.Cooks,2005.** Rapid in situ detection of alkaloids in plant tissue under ambient conditions using desorption electrospray ionization *Analyst*, 130: 1624-1633

- Tei, F, Montemurro, P, Baumann, D, Dobrzanski, A, Giovinazzo, R, Kleifeld, Y, Rocha, F, Rzozi, S, Sanseovic T, Simoncic, A and Zaragoza, C, 2003.** Weeds and weed management in processing tomato. *Acta Horticulturae*, Proceedings of the VIII International Symposium on the Processing Tomato.
- Vaillant, N, Monnet, F, Hitmi, A, Sallanon, H and Coudret, A, 2005.** Comparative study of responses in four *Datura* species to a zinc stress. *Chemosphere*, 59:1005-1013.
- Valrede, P.L, Forfoni, J and Nunez-Farfan, J, 2003.** Evolutionary ecology of *Datura stramonium*: equal plant fitness benefits of growth and resistance against herbivory . *Journal Evolutionary Ecology*, 16:127-137.
- Vrbnicanin, S, Stefanovic, L, Simic, M and Uludag, A, 2006.** Reproductive capacity of Jimsonweed (*Datura stramonium L*), Redroot Rigweed (*Anaranthus rethoflexus L*) and Black Nightshade (*Solanum nigrum L*) under different herbicide regimes in Maize. *Research Journal of Agriculture and Biological Science*, 2: 332-335.
- Zhang, J, Salas ,Jordan, M and Weller N, 1999.** Biorational approaches to managing *Datura stramonium*. *Weed Science*, 47:750-756.
- Weaver S.E. and Warwick, S.I., 1984.** The biology of Canadian weeds. 64. *Datura stramonium L*. *Canadian Journal Plant Science*, 64:979-991.

Ηλεκτρονικές Πηγές

- www.agrotvpos.gr
- www.weedscience.com
- www.weedy.com
- www.plantpro.gr
- www.wikipedia.org
- www.zizania/genika.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Σχήμα 1. Ωριαία καταγραφή της θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, στο Βελεστίνο, κατά τη διάρκεια του έτους 2007.



Εικόνα 1. Βλαστός και άνθη πράσινου βιότυπου τάτουλα



Εικόνα 1. Βλαστός τάτουλα




Εικόνα 2. Άνθος τάτουλα



Εικόνα 3. Το ζιζάνιο τάτουλα

TANENITHMIO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
BIBΛΙΟΘΗΚΗ



004000104282